

KULLANMA TALİMATI

ENFLUCİDE 10 ml burun spreyi

Burun deliklerine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 10 ml'lik sprey 0.01 g nafazolin hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Deiyonize su, borik asit, benzalkonyum klorür, sodyum klorür.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacımıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ENFLUCİDE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ENFLUCİDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ENFLUCİDE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ENFLUCİDE'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ENFLUCİDE nedir ve ne için kullanılır?

ENFLUCİDE'in içeriğinde etkin madde olarak nafazolin hidroklorür bulunmaktadır. Burun boşluğuna tatbikinde şişliği ve tıkanıklığı süratle ve uzun süreli olarak ortadan kaldıran damar büzücü etkiye sahiptir. Nafazolin ve tuzları burun tıkanıklıklarını açmak ve şişliği ortadan kaldırmak için kullanılır.

ENFLUCİDE, 10 ml'lik dozaj spreyli şişelerde takdim edilir.

ENFLUCİDE,

- Nezle, saman nezlesi ve diğer alerjik durumlar ile,
- Soğuk algınlığı ve sinüzit ile birlikte görülen burun tıkanıklıklarının tedavisinde kullanılır.

2. ENFLUCİDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ENFLUCİDE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Nafazolin hidroklorür veya solüsyon içindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz,
- Hamileyseniz veya emziriyorsanız,
- 12 yaşın altında iseniz.
- Rinitis sikka (Burunun ön bölgesindeki kronik iltihabi durum)

ENFLUCİDE 12 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

Eğer yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin size uyduğunu düşünüyorsanız spreyi kullanmayınız. Doktorunuza başvurunuz ve tavsiyesini alınız.

ENFLUCİDE’i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ENFLUCİDE’i almadan önce lütfen aşağıdaki durumların varlığını kontrol ediniz ve herhangi birinin olması durumunda doktorunuzla görüşünüz.

Eğer;

- Baş düzeyinde cerrahi bir müdahale geçirmiş iseniz
- Glökomunuz (göz tansiyonu) varsa
- Kalp-damar hastalığı, aşırı aktif tiroid (hipertiroidizm), diyabet (şeker), yüksek kan basıncı (hipertansiyon), idrara çıkmada zorluk (prostat büyümesi nedeni ile)
- Depresyon, endişe, şizofreni ve diğer ruhsal bozukluklar gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç gruplarından birini (özellikle monoaminooksidaz inhibitörlerini ya da trisiklik antidepresanlar) alıyor ya da almış iseniz
- Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçları (rezerpin, guanethedin gibi) alıyor ya da alıyor iseniz
- Feokromasitoma (Böbrek üstü bezlerinin iç kısmında gelişen tümör)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ENFLUCİDE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ENFLUCİDE burun içine püskürtülerek kullanılır. Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız ENFLUCİDE'i kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız ENFLUCİDE'i kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

ENFLUCİDE'in araç ve makine kullanımı üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

ENFLUCİDE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün (ENFLUCİDE) her 10 ml'lik dozunda 0.125 mg benzalkonyum klorür ihtiva eder; bu dozda benzalkonyum klorüre bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Verilen doz başına 10 mg'ı geçen benzalkonyum klorür deride ve mukozada tahrişe sebep olabilir.

Ayrıca, bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Farklı ilaçlar arasındaki muhtemel etkileşimleri önlemek için, reçetesiz alınmış ilaçlar bile olsa, aldığınız herhangi bir diğer ilaç hakkında her zaman doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ENFLUCİDE ile birlikte kullanılan bazı ilaçlar, ENFLUCİDE ile etkileşebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, özellikle doktorunuza danışınız.

- Depresyon, endişe, şizofreni ve diğer ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (özellikle monoamino oksidaz inhibitörleri ya da trisiklik antidepresanlar)
- Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar (rezerpin, guanethedin gibi)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ENFLUCİDE nasıl kullanılır?

ENFLUCİDE'i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin için en iyi başlangıç dozunu belirleyecektir ve doz ayarlanması bireysel özelliklerinize ve aldığınız diğer ilaçlara göre değişecektir. Doktorunuz söylemedikçe dozunuzu değiştirmeyiniz.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; erişkin ve 12 yaşından büyük çocuklarda burun spreyini her iki burun deliğine bir defa sıkmak yeterlidir. Bu miktar 6 saatte bir tekrarlanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

İlk kullanımdan önce sprey birkaç defa sıkılarak ilacın duman halinde çıkması sağlanır. (daha sonraki kullanımlarda bu tatabikata gerek yoktur). Tam püskürtme sağlandıktan sonra spreyin ucu burun deliğine sokulur. İlaç uygulanmayacak olan burun deliği parmak ile kapatılır. Püskürtme ucu burun deliğine sokulduktan sonra 1 defa basılır, bu esnada nefes alınarak ilacın burnun derinlerine ulaşması sağlanır. Püskürtme ucu, basıncı kaldırmadan burun deliğinden çıkarılır. Eğer gerekli ise aynı işlemler diğer burun deliği için de tekrarlanır.

Her kullanımdan sonra püskürtme ucu sıcak su ile yıkanır veya temiz bir kağıt mendille silinir. Bu işlem sırasında spreyin içine su girmediğinden emin olunur. Kullanıldıktan sonra koruyucu kapak kapatılır.

Değişik yaş grupları:

ENFLUCİDE, 12 yaş yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer ENFLUCİDE'in etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ENFLUCİDE kullandıysanız

ENFLUCİDE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ENFLUCİDE'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

İlacınızı; her gün almanız önemlidir. Tedavi amacı ile kullanım süresi 3 günü aşmamalıdır. Bununla birlikte, eğer bir ya da daha fazla dozu almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz ilacı alınız ve reçetede yazıldığı şekilde devam ediniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ENFLUCİDE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ENFLUCİDE'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyon

Bu ciddi bir yan etkidir.

Eğer sizde mevcut ise, sizin ENFLUCİDE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

- Burunda geçici yanma, batma, kuruluk, burun akıntısı ve hapşırma
- Titreme
- Alışılmadık terleme
- Güçsüzlük

Seyrek:

- Baş ağrısı
- Mide bulantısı

Çok seyrek:

- Baş dönmesi
- Uyuşukluk
- Ruhsal/duygudurum değişiklikleri
- Uyku hali

Bunlar ENFLUCİDE'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ENFLUCİDE'in saklanması

ENFLUCİDE'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ENFLUCİDE'i kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, ENFLUCİDE'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: YENİŞEHİR LABORATUARI TİC. Ve SAN. LTD. ŞTİ.

Plevne Cad. No:101 06350 GÜLSEREN / ANKARA

Telefon : (0 312) 351 34 60-61

Faks : (0 312) 349 35 09

Üretici: YENİŞEHİR LABORATUARI TİC. Ve SAN. LTD. ŞTİ.

Plevne Cad. No:101 06350 GÜLSEREN / ANKARA

Telefon : (0 312) 351 34 60-61

Faks : (0 312) 349 35 09

Bu kullanma talimatı/...../..... tarihinde onaylanmıştır.