

## KULLANMA TALİMATI

### SERDOLECT® 4 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her tablet 4 mg sertindol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mısır nişastası, laktoz monohidrat (inek sütü şekeri), hiproloz, mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat
- **Kaplama maddeleri:** Hipromelloz, makrogol 400, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172)

Bu ürün laktoz monohidrat maddesinde hayvansal kaynaklı madde içermektedir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **SERDOLECT Nedir ve Ne İçin Kullanılır?**
2. **SERDOLECT Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler**
3. **SERDOLECT Nasıl Kullanılır?**
4. **Olası Yan Etkiler Nelerdir?**
5. **SERDOLECT'in Saklanması**

başlıkları yer almaktadır.

### 1. SERDOLECT Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

SERDOLECT 4 mg Film Kaplı Tablet 4 mg sertindol içerir.

SERDOLECT 4 mg Film Kaplı Tablet 30 tabletlik blister ambalajda karton kutu içinde bulunmaktadır.

Oval, sarı, bir tarafında "S4" basılı bikonveks film kaplı tabletlerdir.

SERDOLECT, antipsikotikler olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzelterek etki gösterirler. Beyindeki kimyasallardan dopaminin çok

fazla veya serotoninin çok az olması ruhsal hastalık belirtilerine neden olabilir. SERDOLECT'in etkin maddesi olan sertindol bu dengesizliği düzeltir.

SERDOLECT şizofreni tedavisinde kullanılır. SERDOLECT kalbinizi olumsuz etkileyebileceğinden ancak başka bir antipsikotik ilaç kullanamayacağınıza doktorunuz karar verirse size SERDOLECT reçete edecektir.

SERDOLECT'in size niye reçetelendirildiği konusunda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.

## 2. SERDOLECT'i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

SERDOLECT bellek ve düşünce bozukluğuna yol açan beyin fonksiyon kaybı (demans) olan, ileri yaştaki hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, SERDOLECT'in de içinde bulunduğu gruptan olan ilaçların, demansı olan yaşlı hastalarda inme ve bazı vakalarda ölüm riskini artırabilmesidir.

### SERDOLECT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

- Sertindol veya SERDOLECT'in içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) var ise.
- Su veya tuz dengesi bozukluğunuz var ise (kan potasyum veya magnezyum değerleriniz düşükse) ve doktorunuz bunu düzeltmek için sizi tedavi etmemiş ise.
- Ciddi damar hastalığı veya ciddi kalp hastalığınız (kalp yetmezliği, kalp hipertrofisi (kalp kaslarının kalınlaşması), düzensiz kalp atışları (aritmi), veya alışılmamış yavaş kalp hızı (dakikada 50 atıştan daha az) var ise.
- Doktorunuz elektrokardiyogram (EKG) ile kalp atışınızı ölçmüş ise ve QT aralığında (EKG'nin belirli bir bölümü) bir uzama teşhis etmiş ise. Böyle bir durum kalıtsal olabilir veya kendiliğinden gelişebilir.
- Şiddetli karaciğer hastalığınız var ise.
- QT aralığını uzatabilen veya kanınızdaki SERDOLECT miktarını etkileyebilen ilaçlar kullanıyorsanız. Bu ilaçlara örnek aşağıda verilmektedir:
  - Düzensiz kalp atışlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid).
  - Antipsikotik ilaçlar (örn. tiyoridazin).
  - Makrolid grubu antibiyotikler (örn. eritromisin, klaritromisin).
  - Kinolon grubu antibiyotikler (örn. gatifloksasin, moksifloksasin).
  - Yüksek ateş veya diğer alerjileri tedavi etmek için kullanılan antihistamin grubu ilaçlar (örn. terfenadin, astemizol).
  - Azol grubu antifungal ilaçlar (örn. ketokanazol, itrakonazol).
  - Kalsiyum kanal blokörü olarak bilinen ve yüksek kan basıncını veya göğüs ağrısını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (örn. diltiazem, verapamil).
  - Lityum (bipolar bozukluk tedavisinde kullanılır), sisaprid (mide problemlerinin tedavisinde kullanılır), simetidin (mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır) ve indinavir (AIDS tedavisinde kullanılır) gibi ilaçlar.

### **SERDOLECT'i ařařıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

SERDOLECT gibi ilalar kan pıhtılařma bozukluęu ile iliřkilendirildięi iin, sizde veya ailenizde kan pıhtılařma bozukluęu hikayesi varsa dikkatli kullanınız.

- Eęer yksek tansiyon, kalp-damar bozuklukları veya beyin damar problemleri gibi inme risk faktrleri varsa.
- 65 yařın zerindeyseniz.
- Parkinson hastalıęınız varsa (Titreme, hareketlerde yavařlama, kas sertlięi, yrme bozukluęu ve dięer bazı belirtiler ile birlikte seyreden merkezi sinir sistemi hastalıęı).
- Karacięer hastalıęınız varsa.
- Eęer, normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yařıyorsanız veya yařadıysanız ve aldıęınız ilalar normal beyin aktivitenizi yavařlatıyorsa (depresanlar),

Antipsikotik kullanan demanslı (bunamalı; hafıza ya da zihinsel becerilerde kaybı olan) yařlı hastalarda artmıř inme riski vardır. SERDOLECT'in demanslı yařlı hastalarda kullanılması tavsiye edilmez.

Diyabet hastasıysanız, fiziksel saęlıęınızın takibi de zel dikkat gerektirir. Doktorunuz sizi muayene edecek ve SERDOLECT'in sizin iin uygun olup olmadıęını bildirecektir.

SERDOLECT kullanımının bařlangıcında postural hipotansiyon oluřabilir (Postural hipotansiyon, yatarken veya otururken aniden ayaęa kalkıldıęında meydana gelen pozisyon deęiřiklięine baęlı kan basıncı dřmesidir).

Eęer son zamanlarda veya gemiřte nbet (konvlsiyon) geirmiřseniz SERDOLECT kullanmadan nce doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu durumda SERDOLECT ile daha dikkatli bir tedavi gerekli olacaktır.

Dięer antipsikotiklerde olduęu gibi SERDOLECT ile tedavi sırasında gvdede, yzde, kol ve bacak gibi uzuvlarda istemsiz anormal hareketler (tardiv diskinezi) ortaya ıkabilir. Bu durumda doktorunuz ila dozunu dřrmeyi veya ilacı kesmeyi dřnebilir.

Antipsikotik ila kullanımında nroleptik malign sendrom (NMS) olarak bilinen yksek ateř, bilin düzeyinde deęiřiklik ve kaslarda sertleřme ile ortaya ıkan durum oluřabilir. Doktorunuz ilacınızı hemen sonlandırabilir.

Antipsikotik ilaların aniden kesilmesi halinde; bulantı, kusma, terleme ve uykusuzluk dahil akut ekilme reaksiyonları oluřabileceęinden doktorunuza danıřarak ilacın dereceli olarak kesilmesi tavsiye edilir.

### **Fiziksel Saęlık ve SERDOLECT**

SERDOLECT ile tedavinizden nce ve tedaviniz sırasında doktorunuz SERDOLECT ile tedavinin sizin iin gvenli olup olmadıęına karar vermek iin bazı incelemeler yrtecektir. Bu incelemeler ařařıdakileri ierebilir:

- QT aralıęının uzamadıęını kontrol etmek iin kalbinizin elektrokardiyogramı (EKG). Bu test, yaklařık 3 hafta SERDOLECT ile tedavi edildięinizde veya SERDOLECT'in 16 mg'lık gnlk dozuna ulařtıęınızda ve tekrar 3 ay sonra yapılacaktır. Bu test her 3

ayda bir ve SERDOLECT dozunuz arttırılırsa veya diđer ilalarınuzın dozu deđiřtirilirse tekrarlanacaktır.

- Kanınızdaki potasyum veya magnezyum seviyesi ok dūřuk olursa doktorunuzun bu durumu tedavi etmesi gerekecektir.
- Kan basıncınıuzun izlenmesi.
- Fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilalar, sertindolūn kandaki miktarını 2-3 misline ıkarabilirler. SERDOLECT bu ilalarla birlikte ok dikkatli bir biimde ve ancak potansiyel yarar, riskten fazla ise kullanılmalıdır (Bkz. Diđer ilalar ile birlikte kullanımı).

“Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dōnemde dahi olsa sizin iin geerliyse lūtfen doktorunuza danıřınız.”

### **SERDOLECT’in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

SERDOLECT yiyeceklerle beraber veya tek bařına alınabilir.

### **Hamilelik**

*Eđer hamileyseniz herhangi bir ila kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamilelik sırasındaki SERDOLECT gūvenliliđi kanıtlanmamıřtır. Bundan dolayı SERDOLECT hamilelik sūresince kullanılmamalıdır.

Hamileliklerinin son ū ayında SERDOLECT kullanmıř annelerin yeni dođan bebeklerinde ařađıdaki belirtiler gōrūlebilir: titreme, kas sertliđi ve/veya gūsūzlūđū, uykululuk hali, huzursuzluk, solunum problemleri ve besleme zorluđu. Eđer bebeđinizde bu belirtilerden herhangi biri mevcutsa doktorunuza bařvurunuz.

Sertindolūn cinsel aktivitenizi ve ūreme yeteneđini etkileyebilen yan etkileri olabilir. Bu etkiler sūrekli deđildir. Cinsel aktiviteniz ile ilgili her problemi doktorunuzla gōrūřünüz.

*Hamile kalmayı planlıyorsanız veya SERDOLECT kullanırken hamile kalırsanız doktorunuza danıřınız.*

### **Emzirme**

*Emzirirken herhangi bir ila kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Sertindolūn anne sūtūne gemektedir. Eđer SERDOLECT ile tedavinin gerekli olduđu dūřūnūlurse emzirmeye devam etmemelisiniz.

### **Ara ve makine kullanımı**

SERDOLECT sersemlik haline neden olmaz. Fakat her yeni ilala olduđu gibi, ilacın sizi nasıl etkilediđini gōrūnceye kadar ara veya makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

### **SERDOLECT’in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

Bu ūrūn laktoz iermektedir. Eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu sōylenmiřse bu tıbbi ūrūnū almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Bazı ilaçlar kanınızdaki SERDOLECT miktarını etkileyebilir. Bundan dolayı SERDOLECT aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanıldığında özellikle dikkat etmelisiniz:

- Vücudunuzdaki SERDOLECT miktarının normal düzeylerin üzerine çıkmasına neden olabileceği için fluoksetin ve paroksetin (depresyon tedavisinde kullanılırlar). Doktorunuz SERDOLECT'in dozunu azaltmaya karar verebilir.
- SERDOLECT etkisini azaltabilecekleri için karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), fenobarbiton (epilepsi nöbetini önleyen ve durduran bir ilaç) ve rifampisin (tüberküloz (TB) tedavisinde en yaygın olarak kullanılan antibiyotik).
- Bazı antipsikotikler tarafından etkileri azaltılabileceği için dopamin agonistleri (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır).

Eğer doktorunuz herhangi bir ilacınızın dozunu değiştirirse doktorunuzun ayrıca SERDOLECT dozunu da değiştirmesi ve bir EKG testi yapması gerekebilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. SERDOLECT Nasıl Kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

SERDOLECT'i her zaman doktorunuzun tam olarak söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile konuşmalısınız.

Normal başlama dozu günde 4 mg'dır. İdame dozuna ulaşıncaya kadar doz her 4-5 günde bir 4 mg arttırılacaktır.

Normal idame dozu günde bir kez 12 - 20 mg SERDOLECT'tir. Doktorunuz tarafından reçetelendirilen doz sizin ilaca olan cevabınıza dayanmaktadır. Çok seyrek olarak doktorunuzun günde 24 mg'lık maksimum dozu reçetelendirmesi gerekebilir.

Doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca tabletleri kullanmaya devam ediniz. Kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile doktorunuz tarafından söylenmeden tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Altta yatan hastalık uzun bir süre devam edebilir ve siz tedaviyi kestikten sonra çok yakın bir süre içinde belirtileriniz geri gelebilir. Hiçbir zaman doktorunuzla konuşmadan ilacın dozunu değiştirmeyiniz.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

SERDOLECT, günlük günde bir kez tek doz olarak alınmaktadır. Yiyeceklerle beraber veya tek başına alabilirsiniz, ancak bir öğünle birlikte alırsanız bu size ilacınızı her gün yaklaşık aynı zamanda almanızı hatırlatacaktır. Tabletleri suyla yutunuz

- **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı (18 yaşın altındakiler):**

SERDOLECT çocuklarda ve adolesanlarda (12 ve 16 ila 18 yaş arasındaki genç çocuklar) kullanılmamaktadır.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Doktorunuz muhtemelen tabletlerinizin dozunu normalde tavsiye edilenden daha uzun bir süre sonra yükseltecektir. Ayrıca doktorunuz muhtemelen normalde tavsiye edilenden daha düşük bir idame dozu reçetelendirecektir.

**• Özel kullanım durumları:****Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

SERDOLECT böbrek problemi olan hastalara normal dozlarda verilebilir.

Eğer hafif veya orta şiddetli karaciğer probleminiz varsa doktorunuz sizi daha yakından izlemek isteyebilir ve muhtemelen normalde tavsiye edilenden daha uzun bir süre sonra SERDOLECT dozunuzu yükseltecektir. Ayrıca doktorunuz muhtemelen normalde tavsiye edilenden daha düşük bir idame dozu reçetelendirecektir.

*Eğer SERDOLECT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla SERDOLECT kullandıysanız:**

*SERDOLECT'ten kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Doz aşımı belirtileri:

- Yorgunluk
- Konuşma bozukluğu
- Nabız artışı
- Kan basıncının düşmesi

Sizin veya bir başkasının çok fazla SERDOLECT almış olabileceğini düşünüyorsanız hemen doktorunuz veya eczacınız ile temasa geçiniz veya hemen size en yakın hastanenin acil bölümüne gidiniz. Rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi olmasa da bunu yapınız. Eğer bir doktora veya hastaneye giderseniz SERDOLECT kutusunu yanınıza alınız.

**SERDOLECT'i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.*

Günlük SERDOLECT dozunu almayı unutursanız doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz doğru bir şekilde tedavinizi tekrar başlatacaktır.

**SERDOLECT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

İlacın aniden kesilmesinden dolayı oluşabilecek bir belirtiyi önlemek için tedavinizi ne zaman ve nasıl bitireceğinize doktorunuz karar verecektir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

**4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, SERDOLECT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde, herkeste görülme de, yan etkiler olabilir.

SERDOLECT ile tedavinin başında, yataktan kalktığınızda veya ayağa kalktığınızda başınız dönebilir. Bu SERDOLECT'i bir süre kullandıktan sonra büyük olasılıkla kaybolacaktır. Doktorunuz, tabletlere düşük dozda başlatarak ve dozu birkaç haftada yükselterek baş dönmesi riskini azaltacaktır.

Eğer yan etkiler rahatsız ediciyse veya bir-iki haftadan daha fazla devam ederse doktorunuza danışınız. Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında yer almayan bir etki fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınızla görüşünüz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor.

Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız doktorunuzu bilgilendiriniz veya derhal hastaneye gidiniz.

#### **Yaygın olmayan:**

- Çok hızlı veya düzensiz veya güçlü kalp atışları, baş dönmesi ya da baygınlık. Nefes darlığı ya da göğüs ağrınız da olabilir. Bu belirtiler hayatı tehdit eden düzensiz kalp atış belirtileri olabilir.
- Başta ağız olmak üzere dil ve uzuvların kontrol edilemeyen hareketleri (bu tardiv diskinezi olarak bilinen bir duruma işaret edebilir)

#### **Seyrek:**

- Ateş, hızlı soluma, terleme, kas sertliği ve uyuşukluk veya uykululuk durumlarının bir arada olması (bu belirtiler Nöroleptik Malignant Sendrom belirtileri olabilir)
- Normal gece uykusunda kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi)

#### **Bilinmiyor:**

- Özellikle bacaklarındaki toplar damarlar içinde oluşan kan pıhtıları (bacaklarda şişkinlik, ağrı ve kızarıklık ile kendini gösterir) kan damarları aracılığı ile yukarıya akciğerlere kadar ilerleyerek tıkanma sonucu göğüs ağrısı ve nefes alma güçlüğüne neden olabilir.

#### **Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir:**

#### **Çok yaygın:**

- Rinit (burun tıkanıklığı)
- Ejakülasyon (döl boşaltımı) yetmezliği

#### **Yaygın:**

- Baş dönmesi veya ayağa kalkınca baş dönmesi
- Ağız kuruluğu
- Kilo artışı

- Nefes darlığı
- El veya ayakların terlemesi
- Ciltte uyuşma veya karıncalanma
- Ejakülat hacminde azalma (meni miktarında azalma)
- İmpotens (cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık)
- Kalbinizin elektriksel aktivite değişiklikleri ("QT uzaması" olarak adlandırılır). QT uzaması çarpıntı ve bayılma gibi semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir.
- İdrarda kırmızı ve beyaz kan hücresi. Bu doktorunuz tarafından test edilebilir.

#### **Yaygın Olmayan:**

- Yüksek kan şekeri
- "Torsades de pointes" olarak bilinen düzensiz kalp atımı
- Prolaktin adlı hormonun kandaki seviyesinin yükselmesi
- Göğüslerden süte benzer veya berrak sıvı gelmesi (galaktore)

#### **Bilinmiyor:**

- Neonatal yoksunluk sendromu (doğumu takiben yeni doğan bebeklerde ortaya çıkan huzursuzluk, kas gerginliği (hipertoni), kas gevşekliği (hipotoni), titreme, uyuyamama, solunum sıkıntısı veya beslenme bozukluklarının olduğu klinik tablo)

Antipsikotik tedavi uygulanan demanslı yaşlı hastalarda ölüm oranının antipsikotik tedavi almayanlara kıyasla az miktarda arttığı bildirilmiştir.

Kusmanız veya ishal olmanız durumunda veya diüretik (idrar söktürücü) kullanıyorsanız doktorunuza haber veriniz. Diüretikler, çoğunlukla vücudunuzun fazla su tutması durumunda oluşan ödem veya yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılırlar. Doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını ölçebilir.

*Eğer yan etkilerden biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattının arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. SERDOLECT'in saklanması**

*SERDOLECT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

İşıktan korumak için orijinal ambalajında, 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

SERDOLECT'i ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtir.

İlacınızı evsel atıklarla veya evdeki atık sulara boşaltarak imha etmeyiniz. İlacınızı nasıl imha edeceğinizi öğrenmek için eczacınıza başvurunuz. Bu önlemler çevrenin korunması için önemlidir.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat sahibi:** Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.  
FSM Mah. Poligon Cad.  
Buyaka 2 Sitesi No:8 1.Blok Kat:7  
Ümraniye/İstanbul

**Üretim yeri:** H.Lundbeck A/S  
Ottiliavej 9 2500 Valby, Kopenhag/Danimarka

*Bu kullanma talimatı ..../... tarihinde onaylanmıştır.*