

KULLANMA TALİMATI

IMEX® Merhem
Haricen uygulanır.

Etkin madde: 1 g merhem 30 mg Tetrasiklin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Beyaz vazelin, orta zincirli trigliserid, titanyum oksit, kahverengi demir oksit, kırmızı demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **IMEX® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **IMEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **IMEX® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **IMEX®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. IMEX® nedir ve ne için kullanılır?

IMEX® deri üzerine uygulanan antibiyotikler sınıfına ait tıbbi bir üründür.

IMEX®, tetrasiklin hidroklorür adlı etken madde içermektedir. Bu madde bakterileri öldürür.

Her kutuda bir adet 20, 50 veya 100 g'lık alüminyum tüplerde kullanıma sunulmaktadır.

IMEX®, iltihaplı (yangılı) formları başta olmak üzere, yüzeysel akne tedavisinde kullanılır.

2. IMEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMEX®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer tetrasikline veya ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,

IMEX®'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Tıbbi tedavinin yanında mevcut bilgilere gre ařađıdaki nlemlerin de hasta tarafından alınması nerilir:

Tercihen alkali iermeyen sabunlarla cildin ařırı olmayan bir řekilde ancak dzenli olarak temizlenmesi.

Siyah noktaların ıkarılabilmesine ve temizlenmesine rađmen iltihaplı (yangılı), irinli deri kabarcığı (pstll) řeklindeki aknelerin yara dokusu (skar) oluřumuna neden olmamak iin aılmaması.

Yađ bezlerinin (Sebase glandların) yeniden tıkanmasına neden olmamak iin makyaj yapılmaması ve pudra kullanılmaması.

Uygulama sırasında gz, burun ii, ađız veya mukz membranlarla temasından kaınılması

zellikle hamilelikte kullanım durumunda, deride aık ve derin yara varsa kullanımına hekim tarafından zen gsterilmesi gerekir.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

IMEX®'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

IMEX® haricen cilt yzeyine uygulanır. Yemeklerle ve ieceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Bugne kadar IMEX® kullanımına iliřkin dođumsal oluřum bozukluklarına neden olan etkenler (teratojenik etkiler) veya belirtiyeye ait bir bilgi bulunmamasına rađmen hamilelerde yapılmıř kontroll alıřma sonuları bulunmamaktadır. Bu nedenle btn ilalarda olduđu gibi hamilelerde kullanılması nerilmemektedir.

zellikle uygulanan blgede deri btnlđ bozulmamıř olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Tetrasiklin hidroklorr'n insan style atılıp atılmadıđı bilinmemektedir. Tetrasiklin hidroklorr'n st ile atılımı hayvanlar zerinde arařtırılmamıřtır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacađına ya da IMEX® tedavisinin durdurulup durdurulmayacađına iliřkin karar verilirken, emzirmenin ocuk aısından faydası ve IMEX® tedavisinin emziren anne aısından faydası dikkate alınmalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Bilinen bir etkisi yoktur.

IMEX®'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

IMEX®'in ieriđinde bulunan yardımcı maddeler hakkında zel bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bugüne kadar haricen uygulanan IMEX®'in diğer ilaçlarla bir geçimsizliği bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. IMEX® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise etkilenmiş deri bölgesine günde 1-3 kez uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

IMEX®'in uygulanacağı cilt bölgesi ılık su ve sabun ile iyice temizlendikten sonra kurulur.

IMEX®, etkilenmiş deri bölgesine topikal olarak hafifçe cilde masaj yapılarak yedirilir. Doğru uygulama için küçük bir miktar ilaç, cilt üzerinde renkli yapısı görülmeyecek şekilde geniş bir alana uygulanmalıdır. İstenildiği takdirde uygulama yapılan bölge gazlı bez ile kapatılabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumları hakkında özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer IMEX®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla IMEX® kullandıysanız:

IMEX®'e ait bir doz aşımı bilgisi yoktur.

IMEX®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

IMEX®'i kullanmayı unutursanız

IMEX® doktor tarafından uygulanmaktadır. Tedavinin tekrar edilmesi gereken zamanlarda doktorunuza başvurunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

IMEX® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, IMEX®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan yan etkiler:

- Ağrı
- Ciltte kızarıklık veya şişme

Seyrek yan etkiler:

- Kaşıntı
- Yanma hissi
- Kuruma
- Özellikle saç kökleri etrafında olmak üzere deri renginde açılma

Bunlar IMEX®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. IMEX®'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'ın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra IMEX®'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye, İstanbul

Üretim Yeri: Merz Pharmaceuticals GmbH, Almanya

Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıştır.