

## KULLANMA TALİMATI

**MUPOBEL % 2 krem**  
**Haricen kullanılır.**

- **Etkin madde:** % 2 a/a mupirosin (mupirosin kalsiyum dihidrat olarak) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sıvı parafin, polioksietilen glikol 1000 monosetil eter, stearil alkol, setil alkol, fenoksietanol, benzil alkol, ksantan gum ve saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında;**

- 1. MUPOBEL nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. MUPOBEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. MUPOBEL nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. MUPOBEL'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. MUPOBEL nedir ve ne için kullanılır?**

MUPOBEL aktif madde olarak mupirosin içerir.

MUPOBEL sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

## 2. MUPOBEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### MUPOBEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- MUPOBEL'i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.
- Mupirosin veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere (örn; benzil alkol, fenoksietanol) alerjik iseniz bu ilacı kullanmayınız.

### MUPOBEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eğer daha önceden MUPOBEL'in içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir kreme karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, MUPOBEL kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
- Gözlerinize temas ettirmeyiniz.
- Eğer krem herhangi bir rahatsızlığa neden olursa, uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuşunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### MUPOBEL'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Geçerli değildir.

### Hamilelik

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz söylemedikçe hamileyken MUPOBEL'i kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### Emzirme

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. MUPOBEL'i meme başına sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.

### Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

### MUPOBEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki setil alkol ve stearil alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir. Bu ilaç benzil alkol içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

### Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MUPOBEL diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar MUPOBEL'in işleyişini engelleyebilirler.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. MUPOBEL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

MUPOBEL'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip ediniz. Kremi etkilenmiş bölgeye günde üç kez sürünüz. MUPOBEL'i doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfında kullanınız. Doktorunuzun size söylediğinden daha uzun süre tedaviye devam etmeyiniz. Eğer beş günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız. Tedaviye genellikle en fazla 10 gün devam edilir. 10 günden daha uzun kullanmayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Az miktarda MUPOBEL'i etkilenmiş bölgeye sürünüz. Kremin sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.

#### **Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanımı:** *Bkz:* Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
- **Yaşlılarda kullanımı:** *Bkz:* Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

#### **Özel kullanım durumları:**

*Bkz:* Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

*Eğer MUPOBEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla MUPOBEL kullandıysanız:**

Bu ilaçla aşım doz problemleri olası değildir.

*MUPOBEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **MUPOBEL'i kullanmayı unutursanız**

Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **MUPOBEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi MUPOBEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla

Yaygın: 10 kişide 1'den az, 100 kişide 1'den fazla  
Yaygın olmayan: 100 kişide 1'den az, 1,000 kişide 1'den fazla  
Seyrek: 1,000 kişide 1'den az, 10,000 kişide 1'den fazla  
Çok seyrek: 10,000 kişide 1'den az  
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Yaygın görülen yan etkiler:

- Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. MUPOBEL'in saklanması**

*MUPOBEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUPOBEL'i kullanmayınız.*

#### **Ruhsat Sahibi:**

NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.  
Ümraniye 34768 İSTANBUL

#### **Üretim Yeri:**

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
Sancaklar 81100 DÜZCE

*Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.*