

KULLANMA TALİMATI

MİKODERM Pomad

Cilt üzerine (haricen) uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 g pomad (merhem) 10 mg tolnaftat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Bütil hidroksitoluen, polietilen glikol 400, polietilen glikol 400

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kisisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MİKODERM nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MİKODERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MİKODERM nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MİKODERM'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MİKODERM nedir ve ne için kullanılır?

- MİKODERM, 30 g'lık alüminyum tüpte sunulan, yarı-katı kıvamda, beyazımsı renkte merhemdir.
- MİKODERM, topikal antifungaller (yüzeysel olarak kullanılan mantar tedavisi ilaçları) grubuna ait bir etken madde olan tolnaftat içerir.

- Kılısız düz derilerde ve parmak aralarına yerleşen bir mantar türü olan *Tinea manum'* un, Ayak tabanı ve ayak parmakları arasına yerleşen bir mantar türü olan *Tinea pedis'* in, *Tinea kruris* ve *Tinea korporis* olarak adlandırılan mantar türlerinin bölgesel olarak tedavi edilmesi için kullanılır.

2. MİKODERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MİKODERM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, tolnaftata veya MİKODERM'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

MİKODERM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eğer, MİKODERM ile tedavi sırasında hastalığınız daha kötüleşirse, vakit kaybetmeden doktorunuza bildirin. Tedavinizin durdurulması gerekebilir.
- Eğer, MİKODERM ile dört haftalık tedavinizin sonunda herhangi bir iyileşme olmadığını düşünüyorsanız, doktorunuzla görüşünüz. Farklı ya da ek bir tedavi uygulanması gerekiyor olabilir.
- MİKODERM'in göz, ağız içi, burun içi ve genital bölgeye temasından kaçınılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MİKODERM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MİKODERM gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tolnaftatin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Emzirme döneminde, MİKODERM'i gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

MİKODERM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MİKODERM'in içeriğinde bulunan butil hidroksitoluen, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

MİKODERM'in herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğu dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MİKODERM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

- Hastalıklı yüzeyi tamamen örtecek miktarda MİKODERM günde 2 ila 3 kez uygulanır.
- Kaşıntı ve yanma duyuları 24 ila 72 saat içinde hafifler, tam bir tedaviye 2 ila 4 haftada erişilir. Bu nedenle enfeksiyondan tamamen kurtulmak için, hastalık semptomları geçtikten sonra doktor başka şekilde önermemişse, iki hafta süre ile MİKODERM ile tedaviye devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Haricen uygulanır.

İlaç uygulanmadan önce hastalıklı deri kısmı yıkayıp, kurulayınız. MİKODERM'i hastalıklı yüzeyi tamamen örtecek şekilde hafifçe masaj yaparak uygulayınız.

Yeniden mikrop kapmayı önlemek için tedavi sırasında hijyen şartlarına tam olarak uyulmasına özen gösteriniz. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

MİKODERM, doktor tarafından aksi belirtilmediği sürece 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel doz ayarlamasına gerek yoktur. Doz ve uygulama şekli yetişkinler ile aynıdır.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

MİKODERM'in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına dair bir bilgi yoktur.

Eğer MİKODERM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MİKODERM kullandıysanız:

MİKODERM'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tolnaftatin uygulama yolu dikkate alındığında zehirlenme mümkün değildir. Ancak kaza ile yutulması durumunda belirtilere yönelik semptomatik uygun tedavi uygulanmalıdır.

MİKODERM'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doz uygulanması atlanmamalıdır. Eğer kullanma dozu unutulursa, elden geldiği kadar çabuk giderilmeli ve doz programına devam edilmelidir.

MİKODERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında oluşan herhangi bir yan etki bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MİKODERM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MİKODERM'i kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz:

- Deride tahriş ve şiddetli kaşıntı,
- Kontakt dermatit

Bunlar MİKODERM'in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler ilacın kesilmesiyle ortadan kalkar.

MİKODERM'in duyarlılığa neden olması beklenmez.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MİKODERM'in Saklanması

MİKODERM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MİKODERM'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MİKODERM'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No.88

55020 – SAMSUN

Üretim Yeri : ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Necipbey Cad. No.88

55020 – SAMSUN

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy' tarihinde onaylanmıştır.