

KULLANMA TALİMATI

LEVOZOPİN FORT 60 mg / 5 ml şurup

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 1 ml'de 12 mg Levodropropizin içerir.
- **Yardımcı madde(ler):** Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, metil paraben (E218), propil paraben (E216), sodyum klorür, sukraloz, şeker, maskeleyici aroması 501522T, tutti frutti aroması, çilek aroması, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **LEVOZOPİN FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **LEVOZOPİN FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **LEVOZOPİN FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **LEVOZOPİN FORT'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. LEVOZOPİN FORT nedir ve ne için kullanılır?

LEVOZOPİN FORT, 75 ml'lik şişede, 5 ml'lik işaretli ölçek ile beraber sunulan şuruptur.

LEVOZOPİN FORT etkin madde olarak levodropropizin içerir.

Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürük (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

2. LEVOZOPİN FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEVOZOPİN FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Levodropropizine veya LEVOZOPİN FORT'un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
- Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
- 2 yaşın altında iseniz,
- Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa
- Aşırı balgam çıkarıyorsanız (bronkore)
- Balgam çıkarmayı zorlaştıran hastalığınız (Kartagener sendromu ve mukosiliyer fonksiyon bozukluğu hastalıkları) varsa

LEVOZOPİN FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise (kreatinin klirensi < 35 ml/dak),
- Diyabetiniz (şeker hastalığınız) var ise,
- 65 yaş üstünde iseniz,
- 6 yaşın altında iseniz

hekiminize danışmadan LEVOZOPİN FORT'u kullanmayınız.

LEVOZOPİN FORT uzun süreli tedavilerde kullanılmamalıdır.

Öksürük ilaçları altta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

Kısa süreli bir tedavinin ardından, belirgin bir sonuç alamadıysanız doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEVOZOPİN FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

LEVOZOPİN FORT'un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEVOZOPİN FORT plasenta bariyerini geçtiği için bebeđinize zarar verebilir, bu nedenle hamile iseniz LEVOZOPİN FORT'u kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

LEVOZOPİN FORT anne sütünė geer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

Uyku haline neden olabileceđi iin ara veya herhangi bir makine kullanırken ok dikkatli olmalısınız.

LEVOZOPİN FORT'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LEVOZOPİN FORT řeker ierir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız (dayanıksızlıđınız) olduđu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

Metil paraben ve propil paraben iermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiř) sebebiyet verebilir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Alprazolam, bromezapam, diazepam, klonazepam, klorazepat, klordiazepoksit, buspiron, hidroksizin, zolpidem gibi sedatif (sakinleřtirici) ila alan duyarlı hastalarda kullanılırken dikkatli olunması gerekir.

Eđer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LEVOZOPİN FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklıđı iin talimatlar:

Doktor tarafından bařka bir řekilde tavsiye edilmediđi takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

LEVOZOPİN FORT eriřkinlerde gnde 3 kez ve en az 6'řar saat ara ile 5 ml (60 mg) řurup řeklinde uygulanır.

İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar yada bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır. Öksürük, bir hastalık belirtisidir, bu nedenle asıl hastalık etkeni araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

LEVOZOPİN FORT'un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

LEVOZOPİN FORT sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

3 eşit doza bölünerek en az 6'şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.

20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 2,5 ml

30 kg'ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 5 ml şeklinde uygulanır.

10-20 kg arasındaki çocuklar LEVOZOPİN şurup kullanır.

Yaşlılarda kullanımı:

LEVOZOPİN FORT dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında (kreatinin klirensi < 35 ml/dak); fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer LEVOZOPİN FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla LEVOZOPİN FORT kullandıysanız

LEVOZOPİN FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LEVOZOPİN FORT'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LEVOZOPİN FORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LEVOZOPİN FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LEVOZOPİN FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEVOZOPİN FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok seyrek:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları
- Bulantı - Kusma
- Hazımsızlık

- Midede yanma hissi ve ağrı
- İshal
- Dil iltihabı, ağız yaraları
- Halsizlik - Yorgunluk - Uyuşukluk
- Titreme
- Baş ağrısı
- Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi
- Epilepsi (sara) benzeri nöbet
- Çarpıntı
- Solunum yollarında ödem
- Kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglisemi)
- Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı
- Bacaklarda güçsüzlük
- Geçici görme kaybı ve göz bebeğinde genişleme,
- Düşük tansiyon (hipotansiyon)
- Öksürük
- Nefes darlığı
- El ve ayaklarda, dudaklarda, genital organlarda ve göz kapaklarındaki yumuşak dokuda daha derin ve geniş ödemin bulunduğu cilt reaksiyonu (anjioödem)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. LEVOZOPİN FORT'un saklanması

LEVOZOPİN FORT'u çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVOZOPİN FORT'u kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEVOZOPİN FORT'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

55020 – İlkadım/ SAMSUN

Üretim yeri:

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

55020 – İlkadım/ SAMSUN

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.