

KULLANMA TALİMATI

GYNO-LOMEXIN® %2 Krem

Haricen sürülerek uygulanır.

Etkin madde: 1 g krem 20 mg fentikonazol nitrat içerir.

Yardımcı maddeler: Propilen glikol (E1520), lanolin, badem yağı, yağ asitlerinin poliglikolik esteri, setil alkol, gliseril monostearat, sodyum edetat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. GYNO-LOMEXIN nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. GYNO-LOMEXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. GYNO-LOMEXIN nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. GYNO-LOMEXIN' in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. GYNO-LOMEXIN nedir ve ne için kullanılır?

GYNO-LOMEXIN, antifungal bir ajan olan fentikonazol nitrat aktif maddesini içerir.

GYNO-LOMEXIN belirli cins mantarların büyümesini engeller. Genital candidiasis (Genital pamukçuk) ve gram pozitif bakterilerin oluşturduğu vulvovajinit (dış genital organ ve vajinanın iltihabı) ve servisit (rahimin boyun kısmındaki bölgenin iltihabı) tedavisinde etkilidir.

2. GYNO-LOMEXIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GYNO-LOMEXIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

- Fentikonazol nitrat ya da imidazoller (örn. klotrimazol) olarak bilinen diğer benzer ilaçlara ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

GYNO-LOMEXIN kullanmayınız.

GYNO-LOMEXIN' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

- Kontrasepsiyon için kondom ya da diyafram gibi bir bariyer yöntemi kullandığınız sırada,
GYNO-LOMEXIN'i kullanmayınız.
- GYNO-LOMEXIN'i uyguladığınızda, hafif bir yanma hissedebilirsiniz ancak bu genellikle kısa sürede yok olur.
- GYNO-LOMEXIN'i uzun süre kullanırsanız, ona karşı alerjik olabilirsiniz, bu durumda GYNO-LOMEXIN'i kullanmayı kesiniz.
- Gebe iseniz doktorunuza danışmadan GYNO-LOMEXIN'i kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

GYNO-LOMEXIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GYNO-LOMEXIN'in, uygulama yolu itibariyle, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği sürece bu ilaç kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde doktorunuz tarafından tavsiye edilmediği sürece bu ilacı kullanmamanız önerilir. Emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı

GYNO-LOMEXIN'in araç ve makine kullanımı üzerinde bildirilen bir etkisi yoktur.

GYNO-LOMEXIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu üründeki yardımcı maddelerden

- Propilen glikol (E1520) ciltte tahrişe
- Lanolin ve setil alkol bölgesel cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kremin diğer ilaçlarla etkileşimi muhtemel değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GYNO-LOMEXIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GYNO-LOMEXIN, gece yatmadan önce (gerekirse sabahları da olmak üzere) vajinaya 3 gün süreyle uygulanır. Semptomlarınız hızlıca kaybolabilir, ancak kremi 3 gün boyunca kullanmaya devam ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Enfeksiyonun tekrarlanmasını önlenmesi amacı ile GYNO-LOMEXIN Krem'in penise (prepisium ve glans penis) lokal olarak uygulanarak, partnerin de aynı zamanda tedavi görmesi önerilir.

Bu işlemden sonra her zaman ellerinizi sabun ve sıcak suyla yıkayınız. GYNO-LOMEXIN yağlı değildir, leke yapmaz ve suyla kolayca temizlenir.

Eğer iyileşme gözlenmez ya da durum daha kötüleşirse, doktorunuza danışınız.

Eğer ürünün kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

GYNO-LOMEXIN'in çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:**

Özel kullanımı yoktur.

Eğer GYNO-LOMEXIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GYNO-LOMEXIN kullandıysanız:

Eğer siz ya da bir başkası yanlışlıkla bir miktar GYNO-LOMEXIN yutarsanız hemen bir doktora başvurunuz.

GYNO-LOMEXIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GYNO-LOMEXIN kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı kullanmayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz uygulayınız ve sonra dozları normal zamanında kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

GYNO-LOMEXIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GYNO-LOMEXIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Uygulama bölgesinde hafif ve geçici kızarıklık ya da genellikle hızlıca kaybolan yanma hissi görülebilir.

Uzun süre GYNO-LOMEXIN kullanırsanız, buna karşı alerji geliştirebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GYNO-LOMEXIN'in saklanması

GYNO-LOMEXIN'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutusunda belirtilen son kullanma tarihinden sonra GYNO-LOMEXIN'i kullanmayınız.

İlaçlar atık su ya da evdeki atıklar yoluyla imha edilmemelidir. Artık ihtiyaç duymadığınız ilaçları nasıl imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GYNO-LOMEXIN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Dođan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL

Üretici:

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA

Via Matteo Civitali

1-20148 Milano

İtalya

Bu kullanma talimatı __. __. ____ tarihinde onaylanmıştır.