

KULLANMA TALİMATI

GASTOPAL DUO süspansiyon
Ağız yoluyla alınır.

- Etkin maddeler:** 600 mg kalsiyum karbonat (E170), 70 mg magnezyum karbonat (E504) ve 150 mg sodyum aljinat (E401)
- Yardımcı maddeler:** Sodyum sakarin, ksantan zımkı (E415), benzil alkol, propil paraben (E216), sitrik asit monohidrat, nane aroması, çikolata aroması, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **GASTOPAL DUO nedir ve ne için kullanılır?**
2. **GASTOPAL DUO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **GASTOPAL DUO nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **GASTOPAL DUO'nun saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. GASTOPAL DUO nedir ve ne için kullanılır?

GASTOPAL DUO,

- Her ölçüğünde (1 ölçek=5 ml) 600 mg kalsiyum karbonat, 70 mg magnezyum karbonat ve 150 mg sodyum aljinat içerir.
- PP kapaklı amber renkli Tip III cam şişede, polistren ölçü kaşığı ile birlikte sunulmaktadır.
- Midede asidin ağıza geri gelmesi gibi mideden yemek borusuna mide içeriğinin geri kaçmasına (gastroözofageal reflü) bağlı belirtiler ile mide ağrısı, mide yanması, midede doluluk veya ağırlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, kusma gibi midede asit fazlalığına bağlı belirtilerin giderilmesinde kullanılır.

2. GASTOPAL DUO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GASTOPAL DUO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

- Bu ilacın bileşenlerinden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız varsa,
- Kanda kalsiyum yüksekliği ve/veya idrarda kalsiyum fazlalığına sebep olan rahatsızlığınız varsa,
- Böbreğinizde kalsiyum birikimi veya böbrek taşları tespit edilmiş ise,
- Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
- Kanınızdaki fosfat seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiş ise.

GASTOPAL DUO'yu ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Bu tıbbi ürünü uzun süreli olarak ve tavsiye edilen dozun üzerinde kullanmayınız. Bu tıbbi ürünü kullanmanıza rağmen Őikayetleriniz devam ederse ya da yalnızca kısmen ortadan kalkarsa doktorunuza danıřınız.

Eđer;

- Böbrek yetmezliđiniz ya da böbrek iřlevlerinizde bozukluk varsa
- İdrarda kalsiyum düzeyiniz yüksekse
- Kabızlık, hemoroid (basur) ve sarkoidozunuz (vücuttaki pek çok organı etkileyebilen iltihabi bir hastalık) varsa
- Ciddi ve kronikleřmiř mide bađırsak ile ilgili rahatsızlıđınız varsa
- Çok miktarda süt ve řarküteri ürünü kullanıyorsanız

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

GASTOPAL DUO'yu, önerilen dozlarda almanız kořuluyla hamilelik döneminde kullanabilirsiniz. Hamileler kullanırken tedbirli olmalıdır. Uzun süreli yüksek dozda kullanmayınız. Önerilen maksimum günlük dozu ařmayınız. (Bkz. 3. GASTOPAL DUO nasıl kullanılır?)

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

GASTOPAL DUO'yu, önerilen dozlarda almanız kořuluyla emzirme döneminde kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına olumsuz etki göstermesi beklenmemektedir.

GASTOPAL DUO'nun içeriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 10 mL'de 39,1 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

GASTOPAL DUO, propil paraben içerir. Alerjik reaksiyonlara (gecikmiř) sebebiyet verebilir.

GASTOPAL DUO, tatlandırıcı olarak sakarin içerir ve diyabetikler tarafından da kullanılabilir.

GASTOPAL DUO, benzil alkol içermektedir. Uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldıđında GASTOPAL DUO'nun ya da kullanılan diđer ilacın etkisi deđiřebilir. Ařađıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

- Bir antibiyotik olan tetrasiklinler, kinolonlar,
- Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan glikozitler

- Levotiroksin (tiroid bezinin aşırı çalışması durumunda kullanılan ilaç)
- Eltrombopag (kanda pıhtılaşmayı sağlayan trombosit hücrelerinin sayısında azalma ile birlikte, vücutta purpura denen kırmızı-mor döküntülere sebep olan hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç)
- Fosfat, florür ya da demir içeren ilaçlar
- İdrar söktürücü ilaçlar

GASTOPAL DUO'yu diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya sonra alınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GASTOPAL DUO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde standart doz 10 ml = 2 ölçektir (1 ölçek=5 ml). Bu dozu, ana öğünlerden bir saat sonra ve gece yatarken almanız önerilmektedir. Mide ve/veya göğüste hissedilen yanma şikayetiniz olması durumunda ilave bir doz(=2 ölçek) daha alabilirsiniz.

GASTOPAL DUO'yu günde 12 ölçeğe (1 ölçek=5 ml) kadar kullanabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Doktorunuz GASTOPAL DUO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. 14 gün boyunca kesintisiz GASTOPAL DUO kullanmanıza rağmen şikayetleriniz devam ederse doktorunuza başvurunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı: Özel bir kullanım gerektirmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz varsa GASTOPAL DUO'yu, dikkatli kullanmalısınız. Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa GASTOPAL DUO kullanmamalısınız.

Karaciğer yetmezliği: Özel bir kullanım gerektirmez.

Eğer GASTOPAL DUO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GASTOPAL DUO kullandıysanız:

Bol miktarda su için ve doktorunuza veya eczacınıza danışın. Tavsiye edilen dozdan fazla kullanmadan doğacak aşırı doz belirtileri bulantı ve kusma, kabızlık, yorgunluk, idrar üretiminde artış, susuzluk hissinde artış, normal olmayan kas zayıflıklarıdır.

GASTOPAL DUO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GASTOPAL DUO'yu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GASTOPAL DUO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GASTOPAL DUO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

- Döküntü, kurdeşen, anjiyo ödem (göz kapakları, ağız çevresi, el ve ayaklarda şişlik) ve anafilaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GASTOPAL DUO'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler:

- Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda; bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, kalpte ritim bozukluğu, bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü, reflekslerin zayıflaması, kemik ağrısı, kabızlık, karın ağrısı
- Mide rahatsızlıkları
- İshal
- Süt-alkali sendromu söz konusu olan hastalarda: Tat alamama, kireçlenme, kronik yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık, yemeklerden sonra ağırlık, uyuşukluk

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. GASTOPAL DUO'nun saklanması

GASTOPAL DUO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GASTOPAL DUO'yu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : Liva İlaç Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi No:19/3 Bağcılar-İstanbul
Tel: 444 72 92

Üretim Yeri : Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Karaağaç Mah. Fatih Blv. No:32 ÇOSB Kapaklı/Tekirdağ
Tel: 0282 735 60 00

Bu kullanma talimatı

tarihinde onaylanmıştır.