

## KULLANMA TALİMATI

### DE-LİGHT tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:**

Her tablet 6.05 mg sukraloz içerir.

- **Yardımcı maddeler:**

Laktoz monohidrat, kroskarmeloz sodyum, L-lösin

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de DE-LİGHT'tan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DE-LİGHT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DE-LİGHT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DE-LİGHT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DE-LİGHT'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DE-LİGHT nedir ve ne için kullanılır?**

DE-LİGHT ağız yolundan alınan tatlandırıcılar olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesidir.

DE-LİGHT, şeker (sakkaroz) alınmasının sakıncalı olduğu durumlarda tatlandırıcı amaçla besinleri tatlandırmak için kullanılır.

DE-LİGHT, kullanma talimatı ile birlikte 100, 300 ve 500 tablet içeren otomatik dozajlı plastik ambalajlarda sunulmaktadır.

## **2. DE-LİGHT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **DE-LİGHT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Sukraloz veya içindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa bu ilacı kullanmayınız.

### **DE-LİGHT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü kullanırken dikkatli olunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **DE-LİGHT'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

DE-LİGHT, sıcak ve soğuk içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılır. Güncel literatür bilgilerine göre yüksek sıcaklıklarda potansiyel toksik maddeler oluşabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

DE-LİGHT tablet için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz söylemedikçe hamileyken DE-LİGHT'ı kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirilen çocuk üzerinde yeterli veri mevcut olmadığından doktor kontrolünde kullanılmalıdır. DE-LİGHT tablet emzirme döneminde kullanılabilir.

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz etkisi olabilecek klinik bir bilgiye rastlanamamıştır.

### **DE-LİGHT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

DE-LİGHT laktoz monohidrat içerdiğinden; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DE-LİGHT'ın her dozu 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri konusunda yeterli veri bulunmamaktadır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DE-LİGHT nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Sukralozun günlük kullanım miktarı, vücut ağırlığının her kilogramı için 5 ile 15 mg'dır. Bu seviyeleri aşmamak kaydıyla ihtiyaç kadar kullanılabilir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Ağız yolundan uygulanır. DE-LİGHT, sıcak ve soğuk içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

2 yaş altında kullanımına dair yeterli veri bulunmamaktadır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yeterli veri mevcut değildir.

##### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek yetmezliği:**

Yeterli veri mevcut değildir.

##### **Karaciğer yetmezliği:**

Yeterli veri mevcut değildir.

*Eğer DE-LİGHT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla DE-LİGHT kullandıysanız**

*DE-LİGHT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **DE-LİGHT'ı kullanmayı unutursanız**

İlgili değildir.

**DE-LİGHT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**  
İlgili değildir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DE-LİGHT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, DE-LİGHT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde, vücutta yaygın kızarıklık ve döküntü, anafilaktik şok (şoka kadar ilerlemiş aşırı duyarlılık durumu),

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DE-LİGHT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Bulantı, şişkinlik, ishal

Bunlar DE-LİGHT'ın hafif yan etkileridir.

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. DE-LİGHT'ın saklanması**

*DE-LİGHT'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DE-LİGHT'ı kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DE-LİGHT'ı kullanmayınız.

***Ruhsat Sahibi:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184  
34440 Beyoğlu-İSTANBUL  
Tel: +90 (212) 365 15 00  
Faks: +90 (212) 276 29 19

***Üretici:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
GOSB 1900 Sokak No: 1904  
41480 Gebze-KOCAELİ

*Bu kullanma talimatı 13.07.2017 tarihinde onaylanmıştır.*