

## KULLANMA TALİMATI

### GENVOYA® 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg Film Kaplı Tablet

Ağız yoluyla alınır.

**Etkin maddeler:** Her bir film kaplı tablet 150 mg elvitegravir, 150 mg kobisistat, 200 mg emtrisitabin ve 10 mg tenofovir alafenamide eşdeğer 11 mg tenofovir alafenamid fumarat içerir.

**Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen laktoz), mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz, silikon dioksit, sodyum lauril sülfat ve magnezyum stearat (E572). Kaplama maddesi: Polivinil alkol (E1203), titanyum dioksit (E171), polietilen glikol (E1521), talk (E553b), indigo karmin alüminyum lake (E132) ve sarı demir oksit (E172).

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenilirlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4: Olası yan etkiler nelerdir?

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. GENVOYA nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. GENVOYA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. GENVOYA nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. GENVOYA'nın saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

Çocuğunuz için GENVOYA reçete edildiye, bu kullanma talimatında yer alan bütün bilgilerin çocuğunuza yönelik olduğunu lütfen dikkate alın (bu durumda lütfen "siz" ifadesini "çocuğunuz" şeklinde okuyun).

## 1. GENVOYA nedir ve ne için kullanılır?

- GENVOYA dört etkin madde içerir:
  - **Elvitegravir**, integras inhibitörü olarak bilinen anti-retroviral (HIV'in dahil olduğu retrovirüslere karşı kullanılan ilaç grubu) bir maddedir.
  - **Kobisistat**, elvitegravirin etkisini güçlendiren (farmakokinetik iyileştirici) bir maddedir.
  - **Emtrisitabin**, nükleozid revers transkriptaz inhibitörü (NRTI) olarak bilinen anti-retroviral bir maddedir.
  - **Tenofovir alafenamid**, nükleotid revers transkriptaz inhibitörü (NtRTI) olarak bilinen anti-retroviral bir maddedir.
- GENVOYA, erişkinler, ergenler ve vücut ağırlığı en az 25 kg olan 6 yaş ve üzeri çocuklardaki insan immün yetmezlik virüsü 1 (HIV-1) enfeksiyonunun tedavisine yönelik olarak geliştirilmiş birden fazla etkin maddeyi tek bir tablette içeren bir ilaçtır.

GENVOYA vücudunuzdaki HIV miktarını azaltır. Böylece bağışıklık sisteminiz güçlenir ve HIV enfeksiyonu ile ilişkili rahatsızlıkların görülme riski azaltılır.

- GENVOYA film kaplı tablet, tabletin bir yüzünde "GSI", diğer yüzünde ise "510" yazan, yeşil renkte, kapsül şeklinde bir tablettir. GENVOYA 30 tabletlik şişeler içerisinde sunulmaktadır. Her şişede tabletlerinizin korunması için bir silika jel desikan bulunur ve şişeden çıkarılmamalıdır. Silika jel desikan ayrı bir poşet içinde veya bir kutuda bulunur ve yutulmamalıdır. Şu ambalaj boyutları bulunmaktadır: 1 şişe içerisinde 30 film kaplı tablet içeren kutular ve 90 film kaplı tablet içeren (30'luk 3 şişe) kutular. Tüm ambalaj boyutları piyasaya sürülmemiş olabilir.

## 2. GENVOYA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### GENVOYA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer **elvitegravir**, **kobisistat**, **emtrisitabin**, **tenofovir alafenamid** veya bu ilacın diğer bileşenlerinden (kullanma talimatının başında listelenmektedir) herhangi birine karşı **alerjiniz varsa**.
- **Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız:**
  - **alfuzosin** (prostat bezi büyümesinin tedavisinde kullanılır)
  - **dabigatran** (kanın pıhtılaşmasını önlemekte ve tedavisinde kullanılır)
  - **amiodaron**, **kinidin** (düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılır)
  - **karbamazepin**, **fenobarbital**, **fenitoin** (havale nöbetlerini önlemek için kullanılır)
  - **rifampisin** (tüberküloz ve diğer enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır)
  - **dihidroergotamin**, **ergometrin**, **ergotamin** (migrendeki baş ağrısının tedavisinde kullanılır)
  - **sisaprid** (bazı mide sorunlarını hafifletmek için kullanılır)

- **sarı kantaron** (*Hypericum perforatum*) veya sarı kantaron içeren ürünler (ruhsal çöküntü ve endişe için kullanılan bitkisel ilaçlar)
- **lovastatin, simvastatin** (kandaki kolesterol düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçlardır)
- **pimozid, lurasidon** (anormal düşüncelerin veya hislerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır)
- **sildenafil** (pulmoner arteriyel hipertansiyon -solunumu güçleştiren bir akciğer hastalığı- tedavisinde kullanıldığında ve erektil disfonksiyon - sertleşme sorunu olan erkeklerde kullanıldığında)
- ağız yoluyla kullanılan **midazolam, triazolam** (uyumanıza ve/veya anksiyetenin hafifletilmesine yardımcı olur)

Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, GENVOYA'yı almayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.

### **GENVOYA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

GENVOYA'yı kullanırken doktor kontrolü altında olmalısınız.

Etkili bir antiretroviral tedaviyle, riski azaltılıyor olsa da **bu ilacı almaktayken de başkalarına HIV bulaştırabilirsiniz**. Hastalığınızı başkalarına da bulaştırmaktan kaçınmak için almanız gereken önlemler konusunda doktorunuza danışınız. Bu ilaç, HIV enfeksiyonunun kesin çaresi değildir. GENVOYA'yı alırken de, HIV enfeksiyonu ile ilişkili enfeksiyonlar veya başka hastalıklar geliştirebilirsiniz.

### **GENVOYA'yı almadan önce, doktorunuzla konuşunuz:**

- **Karaciğer sorunlarınız veya hepatit dahil karaciğer hastalığı hikayeniz varsa.**  
Kronik hepatit B veya C dahil karaciğer hastalığı olan ve antiretrovirallerle tedavi edilen hastalar, şiddetli ve potansiyel olarak karaciğere bağlı ortaya çıkan ölümcül rahatsızlıklar açısından daha yüksek risk altındadır. Hepatit B enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz sizin için en iyi tedavi seçeneğini dikkatle değerlendirecektir.

Hepatit B enfeksiyonunuz varsa, bu karaciğer sorunları GENVOYA almayı kestikten sonra kötüleşebilir. Doktorunuzla konuşmadan GENVOYA almayı kesmemeniz önemlidir (bkz. bölüm 3: *GENVOYA almayı kesmeyiniz*.)

- **Laktoza karşı hassasiyetiniz varsa** (bkz. bu bölümde *GENVOYA laktoz içerir*).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **GENVOYA alırken**

GENVOYA almaya başladıktan sonra aşağıdakiler konusunda dikkatli olunuz:

- **İnflamasyon veya enfeksiyon (iltihaplanma) belirtileri**
- **Eklem ağrısı, sertliği veya kemik sorunları**

**Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz.** Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 4: *Olası yan etkiler*.

### **Çocuklar ve ergenler**

Bu ilacı 5 yaş ve altında veya yaştan bağımsız olarak vücut ağırlığı 25 kg'dan az olan **çocuklarda kullanmayınız.** GENVOYA'nın 5 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımını henüz araştırılmamıştır.

### **GENVOYA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

GENVOYA yiyeceklerle beraber alınmalıdır. Daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 3, *GENVOYA nasıl kullanılır?*

### **Hamilelik**

*Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer gebeyken, gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı planlıyorsanız: bu ilacı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

- **Eğer gebe kalırsanız, gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, derhal doktorunuza söyleyin.** Gebe kadınlar GENVOYA kullanmamalıdır. Bu ilacın kanınızdaki miktarı gebelik esnasında azalabilir ve bu da ilacın işe yaramasını engelleyebilir.
- GENVOYA alırken **etkili doğum kontrol yöntemleri kullanın.**

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

**GENVOYA tedavisi sırasında emzirmeyiniz.** GENVOYA bileşimindeki etkin maddelerin bazıları insan sütüne geçtiğinden GENVOYA kullanırken emzirmemelisiniz. Virüsün anne sütüyle bebeğe geçmemesi için emzirmeyiniz.

### **Araç ve makine kullanımı**

GENVOYA baş dönmesini de içeren sersemliğe yol açabilir. GENVOYA alırken başınızın döndüğünü hissederseniz, araç sürmeyin, bisiklet sürmeyin ve herhangi bir alet veya makine kullanmayın.

### **GENVOYA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

**Laktoza ya da diğer şekerlere hassasiyetiniz varsa doktorunuza söyleyiniz. GENVOYA laktoz monohidrat (bir tür şeker) içerir.** Laktoza ya da diğer şekerlere hassasiyetiniz (tahammülsüzlüğünüz) varsa doktorunuza söyleyiniz.

### **GENVOYA'nın diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

**Başka bir ilaç alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.** GENVOYA diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Sonuç olarak GENVOYA'nın ya da birlikte almakta olduğunuz diğer ilaçların kanınızdaki miktarı etkilenebilir. Bu da almakta olduğunuz ilaçların düzgün bir şekilde çalışmasını durdurabilir ya da herhangi bir yan etkisinin ağırlaşmasına neden olabilir. Bazı durumlarda doktorunuzun almakta olduğunuz ilaçların dozunu ayarlaması ya da kanınızdaki düzeylerini ölçmesi gerekebilir.

### **GENVOYA ile birlikte hiçbir şekilde birlikte alınmaması gereken ilaçlar:**

- **alfuzosin** (prostat bezi büyümesinin tedavisinde kullanılır)
- **amiodaron, kinidin** (düzensiz kalp atışlarının tedavisinde kullanılır)
- **karbamazepin, fenobarbital, fenitoin** (havale nöbetlerini önlemek için kullanılır)
- **dabigatran** (kanın pıhtılaşmasını önlemekte ve tedavisinde kullanılır)
- **rifampisin** (tüberküloz ve diğer enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır)
- **dihidroergotamin, ergometrin, ergotamin** (migrendeki baş ağrısının tedavisinde kullanılır)
- **sisaprid** (bazı mide sorunlarını hafifletmek için kullanılır)
- **sarı kantaron** (*Hypericum perforatum*, depresyon ve anksiyete için kullanılan bitkisel ilaçlar) veya sarı kantaron içeren ürünler
- **lovastatin, simvastatin** (kandaki kolesterol düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçlardır)
- **pimozid** (anormal düşüncelerin veya hislerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır)
- **sildenafil** (pulmoner arteriyel hipertansiyon -solunumu güçleştiren bir akciğer hastalığı- tedavisinde kullanıldığında ve erektil disfonksiyon)
- ağız yoluyla kullanılan **midazolam, triazolam** (uyumanıza ve/veya endişenin yoğun olduğu bir hastalık olan anksiyetenin hafifletilmesine yardımcı olur)

Yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmaktaysanız **GENVOYA'yı almayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.**

### **Hepatit B enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ilaçlar:**

Aşağıdakileri içeren ilaçları alıyorsanız GENVOYA'yı almamalısınız:

- **tenofovir alafenamid**
- **tenofovir disoproksil fumarat**
- **lamivudin**
- **adefovir dipivoksil**

Yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmaktaysanız **doktorunuza söyleyiniz.**

### **Diğer tür ilaçlar:**

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmaktaysanız doktorunuzla konuşunuz:

- **antifungal ilaçlar** (mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar):
  - ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazole ve flukonazol
- **antibiyotikler** (tüberküloz [verem] dahil bakterilere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar):
  - rifabutin, klaritromisin ve telitromisin
- **antidepresanlar** (depresyon hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar):
  - trazodon veya essitalopram içeren ilaçlar
- **sedatif ve hipnotikler** (anksiyete hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar):
  - buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem ve lorazepam
- **immün supresanlar** (bir organ nakli olduktan sonra vücudunuzdaki bağışıklık sistemini kontrol etmeye yarayan ilaçlar):
  - siklosporin, sirolimus ve takrolimus
- **kortikosteroidler:**
  - betametazon, budesonid, flutikazon, mometazon, prednizon, triamsinolon. Bu ilaçlar alerjiler, astım, iltihaplı bağırsak hastalıkları ile gözler, eklemler ve kaslardaki iltihaplı hastalıklar ve diğer iltihaplı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Eğer alternatifleri kullanılamıyorsa, ancak tıbbi değerlendirme yapıldıktan sonra ve kortikosteroid yan etkileri için doktorunuz tarafından yakından takip edilerek kullanılabilir
- **şeker (diyabet) hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar:**
  - metformin
- **doğum kontrol ilaçları** (doğum kontrolü için ağız yoluyla kullanılan ilaçlar)
- **erektil disfonksiyon ilaçları** (sertleşme sorunu olan erkeklerde kullanılan ilaçlar):
  - sildenafil, tadalafil ve vardenafil
- **kalp ilaçları:**
  - digoksin, disopramid, flekainid, lidokain, meksiletine, propafenon, metoprolol, timolol, amlodipin, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin ve verapamil
- **pulmoner arteriyel hipertansiyon ilaçları:**
  - bosentan ve tadalafil
- **antikoagülanlar** (kanın pıhtılaşmasını önlemekte ve tedavisinde kullanılan ilaçlar):
  - apiksaban, edoksaban, rivaroksaban ve varfarin
- **bronkodilatörler** (astım ve diğer akciğer hastalıklarında bronşları genişletmek için kullanılan ilaçlar):
  - salmeterol
- **kolesterol düzeyini azaltan ilaçlar:**
  - atorvastatin ve pitavastatin
- **gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar:**

- kolşisin

**Yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmaktaysanız doktorunuza bildiriniz.** Doktorunuza sormadan tedavinizi kendiliğinizden kesmeyiniz.

- **anti-asitler** (mide yanması ya da reflü (midedeki asit sıvısının geri kaçması) hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar; bkz. aynı zamanda bölüm 3: *GENVOYA nasıl kullanılır?*)

**Bir anti-asit ya da multivitamin desteği alıyorsanız, GENVOYA'dan 4 saat önce ya da 4 sonra almalısınız.**

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. GENVOYA nasıl kullanılır?**

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

**Yetişkinler:** Gıdayla birlikte günde bir kez ağızdan tek tablet.

**6 yaşından büyük ve en az 25 kg ağırlığında olan ergenler ve çocuklar:** Gıdayla birlikte günde bir kez ağızdan tek tablet.

**Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız.** Bu, ilacınızın tamamen etkili olduğundan emin olmak ve tedaviye karşı direnç geliştirme riskini azaltmak içindir. Doktorunuz söylemediği sürece dozu değiştirmeyiniz.

**GENVOYA ile aynı zamanda antiasit veya multivitamin kullanmayınız.** Alüminyum/magnezyum hidroksit gibi bir antiasit veya multivitamin takviyesi alıyorsanız, GENVOYA'dan en az 4 saat önce veya en az 4 saat sonra alın.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Günde bir kez ağızdan alınız.

Tableti çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

- **Değişik yaş grupları**

**Çocuklarda kullanım:** GENVOYA'nın güvenliliği ve etkililiği 6 yaşından küçük veya vücut ağırlığı 25 kg'dan az olan çocuklarda henüz belirlenmemiştir. Bu konuda veri mevcut değildir.

**Yaşlılarda kullanım:** 65 yaşın üzerindeki hastalarda GENVOYA için doz ayarlaması gerekmemektedir.

## **Özel kullanım durumları:**

### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Böbreklerinizde ya da karaciğerinizde sorunlar varsa, bkz. Bölüm 2, *GENVOYA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*

*Eğer GENVOYA'nın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla GENVOYA kullandıysanız:**

*GENVOYA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Kazara önerilen dozdan daha fazla GENVOYA aldıysanız, bu ilaca ilişkin olası yan etkilerin görülme riski artabilir (bkz. bölüm 4: *Olası yan etkiler*).

Tavsiye için hemen doktorunuza veya en yakın acil servise başvurunuz. Ne aldığınızı kolayca açıklayabilmemiz için tablet şişesini yanınızda bulundurunuz.

### **GENVOYA'yı kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

GENVOYA dozunun atlanmaması önemlidir.

Bir dozu atlarsanız:

- GENVOYA'yı almadığınızı **normalde aldığınız saatten sonraki 18 saat içinde fark ederseniz** tableti en kısa sürede almalısınız. Tableti her zaman gıdayla birlikte alınız. Sonraki dozu normal saatinde alınız.
- GENVOYA'yı almadığınızı **normalde aldığınız saatten 18 saat veya daha uzun süre sonra fark ederseniz** atlanan dozu almayınız. Bekleyiniz ve sonraki dozu gıdayla birlikte normal saatinde alınız

**GENVOYA'yı aldıktan sonra 1 saatten az bir süre içinde kusarsanız**, gıdayla birlikte başka bir tablet alınız.

### **GENVOYA almayı kesmeyiniz.**

### **GENVOYA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

**Doktorunuzla konuşmadan GENVOYA almayı kesmeyiniz.** GENVOYA'nın kesilmesi gelecekteki tedaviye yanıtınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Herhangi bir nedenle GENVOYA almayı keserseniz GENVOYA tabletlerini almaya yeniden başlamadan önce doktorunuzla konuşunuz.

**Elinizde bulunan GENVOYA'nın azalması durumunda**, doktorunuzdan veya eczacınızdan yenisini alınız. İlacın kısa süre için dahi kesilmesi durumunda virüs miktarı artmaya başlayabileceğinden, bu son derece önemlidir. Daha sonra virüs tedavisi zorlaşabilir.

**Sizde HIV enfeksiyonuna ek olarak hepatit B enfeksiyonu da varsa**, ilk önce doktorunuzla konuşmadan GENVOYA tedavinizi kesmemek özellikle önemlidir. Tedavi kesildikten sonra birkaç ay kan testleri yaptırmanız gerekebilir. İlerlemiş karaciğer hastalığı veya sirozu olan bazı hastalarda, tedavinin durdurulması hepatitinizin yaşamı tehdit edici olabilecek şekilde kötüleşmesine yol açabileceğinden tedavinin kesilmesi önerilmez.

Tedaviyi kestikten sonra, özellikle hepatit B enfeksiyonuyla ilişkilendirdiğiniz belirtiler olmak üzere yeni veya olağandışı belirtileri **hemen doktorunuza bildiriniz**.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorun.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

HIV tedavisi sırasında, vücut ağırlığında, ayrıca kan lipidleri ve kan şekeri düzeylerinde artış olabilir. Bu durum kısmen düzelen sağlığa ve yaşam tarzına, kan lipidleri durumunda da bazen HIV ilaçlarının kendisine bağlıdır. Doktorunuz bu değişiklikler için test uygulayacaktır.

Tüm ilaçlar gibi bu ilacının içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. HIV enfeksiyonunu tedavi ederken, istenmeyen bazı etkilerin GENVOYA'ya mı bağlı, aynı zamanda almakta olduğunuz diğer ilaçlara mı bağlı, yoksa HIV hastalığının kendisine mi bağlı olduğunu belirlemek her zaman mümkün değildir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, GENVOYA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- **Yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme (anjioödem).**

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GENVOYA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

- **Kanınızda çok fazla laktik asit olması (laktik asidoz).**

Çok fazla laktik asit ciddi, ancak nadir görülen ve ölüme neden olabilen bir tıbbi acil durumdur. Şu belirtileri yaşayacak olursanız, hemen sağlık uzmanınıza söyleyiniz: güçsüzlük veya normalden daha fazla yorgunluk, olağandışı kas ağrısı, nefes darlığı ya da hızlı nefes alma, bulantı ve kusma ile birlikte mide ağrısı, soğuk ya da mavi el ve ayaklar, baş dönmesi veya sersemlik hissi, ya da hızlı veya anormal kalp atışı.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- **İnflamasyonun veya enfeksiyonun herhangi bir belirtisi.** İlerlemiş HIV enfeksiyonu (AIDS) ve fırsatçı enfeksiyon (zayıf bağışıklık sistemine sahip kişilerde görülen enfeksiyonlar) geçmişi olan bazı hastalarda, önceki enfeksiyonlardan kaynaklanan inflamasyon işaret ve belirtileri ve anti-HIV tedavisi başladıktan hemen sonra görülebilir. Bu belirtilerin, vücutta belirgin belirtiler göstermeksizin mevcut olan enfeksiyonlarla savaşmasını sağlayan vücudun immün cevabındaki bir gelişme nedeniyle görüldüğü düşünülmektedir.
- **Oto-immün hastalıklar,** bağışıklık sisteminin sağlıklı vücut dokularına saldırması, HIV enfeksiyonu için ilaçlarınızı almaya başladıktan sonra görülebilir. Oto-immün hastalıklar tedaviye başladıktan aylar sonra görülebilir. Enfeksiyona ilişkin belirtilere ya da aşağıdakilere dikkat ediniz:
  - kaslarda zayıflık,
  - el ve ayaklarda başlayarak vücuda doğru ilerleyen halsizlik,
  - çarpıntı, titreme ya da aşırı aktivite.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

**Bunları veya inflamasyon veya enfeksiyon belirtileri fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin.**

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

### **Çok yaygın görülen yan etkiler**

- Bulantı

### **Yaygın görülen yan etkiler**

- Anormal rüyalar
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- İshal
- Kusma
- Mide ağrısı
- Gaz çıkarma
- Döküntü

- Yorgunluk/halsizlik

### **Yaygın olmayan yan etkiler**

- Düşük eritrosit sayımı (anemi)
- İntihar düşüncesi ve intihar girişimi (daha önce depresyon ya da akıl sağlığı problemleri olan hastalarda), depresyon
- Yemeklerden sonra rahatsızlığa neden olan sindirim sorunları (dispepsi)
- Yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme (anjioödem)
- Kaşıntı (pruritus)
- Kurdeşen (ürtiker)

Herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuza bildiriniz.

### **HIV tedavisi sırasında görülebilen diğer yan etkiler**

Aşağıdaki yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir (sıklık, eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

- **Kemik sorunları.** GENVOYA gibi kombine antiretroviral ilaçları alan bazı hastalar, *osteonekroz* (kemiğin kan dolaşımının azalmasına bağlı kemik dokusunun ölümü) olarak bilinen bir kemik hastalığı geliştirebilirler. Bu tür ilaçların uzun süre kullanımı, kortikosteroid kullanımı, alkol kullanımı, çok zayıf bağışıklık sistemine sahip olmak ve aşırı kilolu olmak, bu hastalığın gelişmesine ilişkin birçok risk faktöründen bazıları olabilir. Osteonekroz belirtileri şunlardır:
  - Eklemlerde sertlik
  - Eklemlerde ağrı ve acı (özellikle kalça, diz ve omuz eklemlerinde)
  - Hareket güçlüğü

Belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **Yan etkilerin raporlanması:**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## **5. GENVOYA’nın Saklanması**

*GENVOYA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GENVOYA'yı kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade eder.

30°C altındaki oda sıcaklığında ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız. Şişeyi sıkıca kapalı olarak saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi:***

Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti.  
İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, No:10/12, Kat:21  
And Ofis  
34752 Ataşehir, İstanbul  
Tel: 0216 559 03 00

***Üretim Yeri:***

Patheon Inc.  
2100 Syntex Court,  
Mississauga, Ontario, Kanada

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.