

## KULLANMA TALİMATI

**PROCTOLOG** rektal krem  
Topikal olarak uygulanır.

**Etkin Madde:** 100 mg'lık kremde 0.500 g. Ruskogenin ve 5.800 g. Trimebutin

**Yardımcı Maddeler:** Emülsifiye edici bal mumu, setostearil alkol, izopropil miristat, propilen glikol, gliserol monostearat, metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacımıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.*

**Bu Kullanma Talimatında :**

1. **PROCTOLOG nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PROCTOLOG'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PROCTOLOG nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PROCTOLOG'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1.PROCTOLOG nedir ve ne için kullanılır?**

PROCTOLOG 30g.'lık alüminyum tüplerde takdim edilir.

Etkin madde olarak Ruskogenin ve Trimebutin içerir.

Anal (makat) bölgedeki hemoroid (basur), çatlak ve iltihaplı hastalıklarda ve ağrı, kaşıntı ve şişkinlik hissi gibi bulgularla seyreden anal bölgenin diğer hastalıklarında kullanılır.

### **2. PROCTOLOG'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**PROCTOLOG'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer PROCTOLOG veya içerdiği herhangi bir maddeye (özellikle propilen glikol) karşı aşırı allerjiniz varsa kullanmayınız.

## **PROCTOLOG'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

PROCTOLOG'un kullanılması, diđer anal hastalıkların tedavisine ara verilmesini gerektirmez. Tedavi kısa süreli olmalıdır. Tedavi sırasında bulgularınızda herhangi bir iyileřme görölmez ise doktorunuza bilgi veriniz.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### **PROCTOLOG'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yiyecek ve ieceklerle etkileřmesine dair veri mevcut deđildir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

PROCTOLOG gerekli olmadıka gebelik döneminde kullanılmamalıdır

*Tedavi sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

PROCTOLOG'un emzirme döneminde kullanılabilir.

### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı üzerine veri mevcut deđildir.

### **PROCTOLOG'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat ierir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiř) sebebiyet verebilir.

Setostearil alkol ierir ve bölgesel deri reaksiyonlarına (örneğin;ekzema) neden olabilir.

Propilen glikol ierir. Ciltte tahriře neden olabilir.

Bu ila gliserol ierir ve hafif derecede dıřkılama artışına neden olabilir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

PROCTOLOG'un herhangi bir ilala etkileřimde bulunduđuna dair alıřma mevcut deđildir.

*Eđer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. PROCTOLOG nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Genel olarak, günde bir veya iki kez makat bölgesine uygulanır

- **Uygulama yolu ve metodu:**

PROCTOLOG makat bölgesine kullanım için uygundur.

- **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda (ve 18 yaş altı ergenlik dönemindeki gençlerde), kullanım için yeterli veri mevcut değildir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılardaki (65 yaş ve üzeri) kullanım için yeterli veri mevcut değildir.

- **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olanlarla kullanım için yeterli veri mevcut değildir.

*Eğer PROCTOLOG'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla PROCTOLOG kullandıysanız**

*PROCTOLOG'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **PROCTOLOG'u kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **PROCTOLOG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bilinmemektedir.

### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PROCTOLOG'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

PROCTOLOG kullanımı ile duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, tedavi kesilmeli ve uygun tedavi uygulanmalıdır. Çok uzun süre kullanıldığında sistemik toksik tesirler görülebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmeyen	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Bilinmeyen:**

Uygulama bölgesinde hassasiyet, kızarıklık, kaşıntı, baş dönmesi, bayılma

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. PROCTOLOG'un saklanması**

*PROCTOLOG'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROCTOLOG'u kullanmayınız.*

**Ruhsat sahibi:**

Pfizer İlaçları Ltd. Şti.  
34347 Ortaköy-İSTANBUL

**Üretici:**

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Esenyurt / İstanbul

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*