

KULLANMA TALİMATI

TİREBRANT® FORT 200 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 200 mg trimebutin maleat içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklıdır), sodyum nişasta glikolat, poloksamer 188, hidroksipropil metil selüloz, tartarik asit, mikrokristalin selüloz pH101, silikon dioksit, magnezyum stearat, sodyum stearil fumarat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **TİREBRANT FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TİREBRANT FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TİREBRANT FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TİREBRANT FORT'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. TİREBRANT FORT nedir ve ne için kullanılır?

TİREBRANT FORT 20, 40 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Beyaz renkli, bir yüzü çentikli bikonveks (iki yüzü dış bükey) tabletlerdir

TİREBRANT FORT'un etkin maddesi trimebutin maleat sindirim hareketliliğini düzenleyen bir ajandır. Sindirim kas hareketlerinde azalma varsa sindirim kaslarını uyarıcı; sindirim kas hareketlerinde artış varsa ordaki spazmı çözücü olarak etkir. Bu düzenleyici aktivite bütün sindirim kanalında görülür. Hareket bozukluklarına bağlı olan fonksiyonel sindirim hastalıklarında; fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler.

TİREBRANT FORT;

- İrritabl bağırsak sendromunun (spastik kolon) belirtilerinin tedavisinde,
- Fonksiyonel sindirim bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde,
- Gastrointestinal ağrının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Laktoz monohidrat inek st kaynaklıdır.

2. TİREBRANT FORT'u kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler

TİREBRANT FORT'u ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Trimebutin ve formlasyonda bulunan maddelerden herhangi birine karřı ařırı duyarlılık durumları var ise kullanmayınız.

TİREBRANT FORT'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Herhangi bir zel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

"Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız."

TİREBRANT FORT'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

Yiyecek ve iecek ile etkileřimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Yeterli alıřma bulunmadıđından; gebeliđin ilk 3 ayı iinde kullanılması nerilmez. 2. ve 3. dnemlerde ancak gerekli ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Anne stne geebileceđinden emziren annelere verilmemelidir.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımı zerine etkisi bildirilmemiřtir.

TİREBRANT FORT'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

TİREBRANT FORT laktoz iermektedir.

Eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilala etkileřim bildirilmemiřtir.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TİREBRANT FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Hekim önerisine göre kullanılır.

Genelde önerilen doz, erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Pediyatrik popülasyon:

TİREBRANT'ın kullanımı çocuklarda uygun değildir.

Pediyatrik popülasyonda kullanım için süspansiyon formu mevcuttur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı hakkında herhangi bir kısıtlama bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer TİREBRANT FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TİREBRANT FORT kullandıysanız:

TİREBRANT FORT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TİREBRANT FORT'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TİREBRANT FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TİREBRANT FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TİREBRANT FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
- Deri döküntüsü
- Baygınlık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TİREBRANT FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok Seyrek

- Ciltte reaksiyon

Seyrek

- Baş dönmesi
- Uyuklama

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığımız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TİREBRANT FORT'un saklanması

TİREBRANT FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TİREBRANT FORT'u kullanmayınız.

“Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

Ruhsat Sahibi: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Bağcılar/İstanbul

Üretim Yeri : Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.