

## KULLANMA TALİMATI

### ADADERM % 0.1 jel

Haricen kullanılır.

Cilt üzerine uygulanır.

**Etkin madde** : 100 g jel, 0.1 g Adapalen içerir.

**Yardımcı maddeler** : Karbomer 980, Propilen glikol, Poloksamer 124, Disodyum EDTA, Metil parahidroksibenzoat (E218), Fenoksietanol, Sodyum hidroksit, Saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında :**

**1. ADADERM nedir ve ne için kullanılır?**

**2. ADADERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**3. ADADERM nasıl kullanılır?**

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

**5. ADADERM'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

**1. ADADERM nedir ve ne için kullanılır?**

ADADERM, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulan beyaz homojen jeldir.

ADADERM, orta şiddetteki aknenin (sivilce) harici tedavisinde kullanılır.

**2. ADADERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**ADADERM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ!**

Eğer;

Etkin madde adapalene veya ADADERM'in herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise,

### **ADADERM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Kullanılan miktarların artırılması, ilacınızın etkisini veya etki hızını arttırmaz ancak ciltte kızarıklığa, soyulmaya veya rahatsızlığa neden olabilir.

İlacın aktivitesinden dolayı, bu jel normalde cildi tahriş etmektedir. Bu sorunu azaltmak için birkaç önlem alınmalıdır.

- İlacı kullanırken, gözlerinizle, göz kapaklarınızla, burun deliklerinizle ve ağızınızla temasından kaçınınız. Kazayla bir temas meydana gelirse, su ile iyice yıkayınız.
- Hali hazırda bu tedavi öncesinde diğer lokal eksfoliyatif (ciltteki ölü derinin dökülmesi için kullanılan) preparatlar ile tedavi edilmiş iseniz, bu tedaviye başlamadan önce derinizdeki tahriş geçene kadar bekleyiniz.
- Güneş ışığına ve ultraviyole lambalarına maruz kalınması, ek tahriş neden olmaktadır. Bu nedenle, tedavi süresince mümkün olduğu ölçüde maruz kalmaktan kaçınınız. Ancak, maruz kalım asgariye indirilmiş (şapka takılması, güneş kremi kullanılması) ise ve uygulamalar arasında geçen süre ayarlanmış ise, tedaviye devam edilebilir.
- Güneşe olağan dışı bir maruz kalma (örneğin, plajda geçen bir gün) söz konusu ise, ADADERM'i bir gün öncesinde, aynı gün içerisinde ve bir gün sonrasında uygulamayınız. Daha önceki maruz kalım yanıklara (güneş yanıklarına) neden olmuş ise, tedaviniz başlamadan önce bu yanıkların tamamen iyileşmesini bekleyiniz.
- Ek tahriş neden olabilecek, temizleyici astrenjan olan kozmetik ürünlere ve kurutucu veya tahriş edici ürünleri (parfümlü veya alkol içeren ürünler gibi) ADADERM ile birlikte kullanmayınız.
- Test edilmiş nonkomedojenik (siyah noktalara neden olmayan) ürünlerden seçmeniz koşuluyla arzu ettiğiniz makyaj ürünlerini veya nemlendiricileri kullanabilirsiniz (doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye alınız).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **ADADERM'in yiyecek ve iecek ile kullanılması:**

ADADERM'in uygulama yntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamilelik boyunca ADADERM kullanmayın.

Beklenmeyen bir hamilelik durumunda, tedavinizi durdurun.

*Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Bebeėinizi emzirirken ADADERM kullanabilirsiniz. Bebeėin kazara ilala temasını nlemek iin emzirirken gğsnze ADADERM srmeyin.

### **Ara ve makine kullanımı**

Bildirilmemiřtir.

### **ADADERM'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

ADADERM'in ieriėinde bulunan,

- Metil parahidroksibenzoat alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
- Propilen glikol ciltte tahriře sebep olabilir.

### **Diėer ilalar ile birlikte kullanımı**

ADADERM ciltten sadece az miktarda emildiėinden diėer ilalarla etkileşimi olası deėildir.

*Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lutfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ADADERM nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklıėı iin talimatlar:**

ADADERM, gnde bir kez gece yatmadan nce uygulanır.

İyileşmenin ilk belirtileri, genellikle tedavinizin 4.ve 8. haftaları arasında grnmektedir.

Tedaviniz ortalama 3 ay suresince devam etmelidir.

**Uygulama yolu ve metodu:**

Cilt üzerine sürülerek kullanılır.

Bezelye tanesi büyüklüğünde jeli, günde bir kez yatmadan önce cildiniz yıkanıp dikkatlice kurulandıktan sonra gözlerinize, göz kapaklarınıza, burun deliklerinize ve dudaklarınıza temas ettirmeden sivilcelerin üzerine yayarak sürün.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı incelenmemiştir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

65 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarla yapılmış yeterli çalışma yoktur.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek /Karaciğer yetmezliğinde kullanım ile ilgili bilgi yoktur.

*Eğer ADADERM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla ADADERM kullandıysanız:**

Topikal olarak fazla miktarda ADADERM kullanılması ciltte kızarıklığa, soyulmaya veya rahatsızlığa neden olabilir.

*ADADERM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**ADADERM'i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**ADADERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bilinmemektedir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, ADADERM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

- Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
- Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Yaygın :**

- Cilt kuruluđu
- Ciltte tahriř,
- Ciltte yanma hissi,
- Ciltte kızarıklık eritem)

**Yaygın olmayan :**

- Kontakt dermatit
- Ciltte rahatsızlık hissi
- Güneř yanığına benzer yanma hissi,
- Cilt kařıntısı ( pruritis)
- Aknenin alevlenmesi

**Bilinmiyor :**

- Gözde tahriř
- Göz kızarıklığı
- Göz kařıntısı,
- Göz kapaklarında şiřlik
- Ciltte ağrı, şiřlik

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılařtığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “ İlaç Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın güvenliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. ADADERM’in saklanması**

ADADERM’i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ADADERM’i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat sahibi:***

Kurtsan İlaçları A.Ş.

İstoç Otomarket, A-2 Blok, Burak Plaza 7

34218 Bağcılar / İstanbul

Tel: 0212 481 30 50

Fax: 0212 481 59 19

***Üretim Yeri :***

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş

Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

No: 36 Kapaklı / Tekirdağ

*Bu kullanma talimatı ...../...../..... tarihinde onaylanmıştır.*