

KULLANMA TALİMATI

TERRAMYCIN 30 mg/ 10.000 IU deri merhemi

Deriye lokal olarak uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin'e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B'ye eşdeğer polimiksin B sülfat bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Sıvı petrolatum, beyaz petrolatum

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **TERRAMYCIN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TERRAMYCIN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TERRAMYCIN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TERRAMYCIN®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. TERRAMYCIN® nedir ve ne için kullanılır?

TERRAMYCIN® 14.2 g'lık tüplerde kullanıma sunulmuştur. Özel bir vazelin sıvağı içinde süspansiyon halinde tetrasiklin grubundan bir antibiyotik olan kristal oksitetrasiklin hidroklorür ve polimiksin grubundan bir polipeptit antibiyotik olan polimiksin B sülfat içerir.

TERRAMYCIN® yumuşak, sarı homojen merhemdir.

TERRAMYCIN® deri üzerine lokal (topikal) olarak kullanılan ve antibiyotikler olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.

TERRAMYCIN® lokal cilt enfeksiyonlarının (özellikle iltihaplı enfeksiyonlar) ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıkların koruma ve lokal tedavisinde kullanılır.

2. TERRAMYCIN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TERRAMYCIN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Oksitetrasiklin, polimiksin B veya TERRAMYCIN® içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet gösterdiyseniz TERRAMYCIN® kullanmayınız.

TERRAMYCIN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

TERRAMYCIN®'i kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşün.

Eğer;

- TERRAMYCIN®'in iyi tolere edilmediği durumlarda, örneğin yeni enfeksiyonların ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz (bkz. “Olası yan etkiler”).
- Tatmin edici herhangi bir iyileşmenin görülmesinde gecikme olursa veya enfeksiyon kötüleşirse doktorunuzu bilgilendirin.

TERRAMYCIN®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşmesine dair veri mevcut değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebekte yan etkilere neden olma riski olabileceğinden, hamileyseniz TERRAMYCIN® merhemi dikkatli kullanmanız gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebekte yan etkilere neden olma riski olabileceğinden, emziriyorsanız TERRAMYCIN® merhemi dikkatli kullanmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

TERRAMYCIN kullanımı ile ilgili olarak, bugüne kadar araç sürme veya makine kullanımı üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.

TERRAMYCIN®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TERRAMYCIN®'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere dair herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TERRAMYCIN®'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TERRAMYCIN® nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde cildinizi özenli bir şekilde temizledikten sonra steril bir gazlı bez üzerine konulan merhemi hasta bölgeye günde en az 2-3 kez uygulayınız. Merhemi tedavi edilen cilt yüzeyi ile sürekli temas halinde bırakınız.

Tedavinizin süresi enfeksiyonun şiddeti ve türüne bağlı olup, birkaç günle birkaç hafta arasında değişebilir. Tam iyileşme sağlanana kadar tedaviye devam ediniz.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

TERRAMYCIN®'i sadece lokal olarak uygulayınız. Haricen kullanım içindir.

- **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanım

Terramycin, hasarlı diş oluşumunu önlemek için çocuklarda dişlerin oluştuğu dönemde (hamileliğin ikinci yarısı, erken çocukluk dönemi ve 8 yaşa kadar) dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanım

Özel kullanımı yoktur.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Özel kullanımı yoktur.

Eğer TERRAMYCIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TERRAMYCIN® kullandıysanız:

Aşırı doz durumunda belirli bir antidot yoktur.

TERRAMYCIN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TERRAMYCIN®'i kullanmayı unutursanız:

TERRAMYCIN® kullanmayı unutursanız bir sonraki doz zamanı çok yakın değilse mümkün olan en kısa sürede bir doz uygulayın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TERRAMYCIN® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavinin erken kesilmesi durumunda hastalık yapıcı organizmanın yeniden üremesi söz konusu olacağından tam iyileşme sağlanana kadar tedaviye devam ediniz. Tedaviyi erken bırakmayı düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza danışınız.

TERRAMYCIN® kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışın.

4. **Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, TERRAMYCIN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın	: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

- Kontakt dermatit (dış etkenlerin deriye temasıyla oluşan egzama tipi reaksiyon)*
- Kızarma, şişme, kaşınma, kabarcık oluşumu gibi kişisel aşırı duyarlılık ile ilgili alerjik reaksiyonlar*

* Bu reaksiyonlar oluşursa tedavi durdurulmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TERRAMYCIN®'in saklanması

TERRAMYCIN®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TERRAMYCIN®'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Pfizer PFE İlaçları A.Ş. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy/ İstanbul

Üretim yeri: Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy/ İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.