

KULLANMA TALİMATI

VAGI-HEX® VAGİNAL TABLET, 12 tablet.
Vajinal yolla uygulanır.

Etkin madde: 1 vajinal tablet 10.0 mg Heksetidin içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalize sellüloz, Magnezyum stearat, 1-tetradekanol, Sorbitol, Polisorbat 60, Povidon K25, Krosopovidon, Yüksek derecede disperse silikon dioksit, Yüksek zincirli parsiyel gliseritler, Tartarik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **VAGI-HEX® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VAGI-HEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VAGI-HEX® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VAGI-HEX®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. VAGI-HEX® nedir ve ne için kullanılır?

VAGI-HEX® güçlü bir vajinal mikrop öldürücüdür (antiseptik).

VAGI-HEX® heksetidin içermektedir ve doğal vajinal flora üzerine kötü bir etkisi olmadığı gösterilmiştir.

Her kutuda 12 adet vajinal tablet bulunan formda kullanıma sunulmaktadır.

VAGI-HEX®, vajinal enfeksiyonlarda kullanılır.

2. VAGI-HEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VAGI-HEX®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

- Hamileliğin ilk üç ayında (trimesterinde) iseniz,
- Ürünün içeriklerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılık durumunuz var ise.

VAGI-HEX®'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Eęer daha 6nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksız olduęunuz s6ylenmiře bu tıbbi 6r6n6 almadan 6nce doktorunuzla temasa geiniz.
- Hassasiyet reaksiyonları olan bazı kiřilerde ve alerjik b6nyeli řahıslarda VAGI-HEX® lokal cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Eęer b6yle bir ařırı hassasiyet ortaya ıkarırsa VAGI-HEX® uygulaması hemen kesilmelidir.
- B6t6n vajinal supozituvlar, doęum kontrol6 iin kullanılan bazı lateks 6r6nlerinin (6rneęin; diyaframlar ve kondomlar gibi) koruyucu etkinlięini azaltabilirler.
- Relapsların oluřumunu engellemek iin ekstravajinal alan ve kiřinin cinsel partneri de tedavi edilmelidir. İlave olarak daha kısa s6rede tedavinin gerekleřebilmesi iin tedavi s6resinde koitusdan kaınılmalıdır.
- Tedavi sırasında, tedavinin bařarısı iin 6zel hijyenik tedbirlerin de alınması gerekir (genital hijyen, i amařlarının g6nl6k deęiřtirilmesi gibi).

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin iin geerliyse l6tfen doktorunuza danıřınız.

VAGI-HEX®'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

VAGI-HEX® vajinal yolla uygulanır. Yemeklerle ve ieceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamilelięin ilk 3 ayında kullanımına iliřkin yapılmıř kontroll6 alıřmalar bulunmamaktadır. Bu d6nemde kullanılmamalıdır. Ancak gebelięin 3. ayından sonra kullanımı ile ilgili klinik alıřmalar mevcuttur ve alıřmalar anne ve fet6se herhangi bir zararı ortaya koymamıřtır. Ancak b6t6n ilaların hamilelik d6neminde kullanımı fayda/zarar iliřkisinin deęerlendirildięi hekim kararı ile olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczanıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme d6neminde kullanımına iliřkin yapılmıř klinik alıřmalar mevcuttur ve alıřmalar anne ve bebeęe herhangi bir zararı ortaya koymamıřtır. Ancak b6t6n ilaların emzirme d6neminde kullanımı fayda/zarar iliřkisinin dikkatle deęerlendirildięi hekim kararı ile olmalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımı 6zerine bilinen bir etkisi yoktur.

VAGI-HEX®'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında 6nemli bilgiler

VAGI-HEX®'in ierięinde Sorbitol bulunmaktadır. Eęer daha 6nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksız olduęunuz s6ylenmiře, bu tıbbi 6r6n6 kullanmadan 6nce doktorunuzla temasa geiniz.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Bařka ilalarla bilinen bir geimsizlięi yoktur.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya kısa s6re 6nce kullandıysanız l6tfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

3. VAGI-HEX® nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve dozu/uygulama sıklığı için talimatlar:**
6 gün boyunca, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanılır.
- **Uygulama yolu ve metodu:**
Vajinal tableti, sabahları ve akşam yatağa gitmeden önce; sırt üstü yatarken, vajinal kanal içine derin olarak yerleştirin.
Şikayetler (kaşıntı, akıntı) daha önce kesilse bile tedavi 6 tam gün sürmelidir. Eğer tedavi daha kısa sürede bırakılırsa nüksler ortaya çıkabilir. Adet dönemi sırasında tedavi kesilmemelidir.
- **Değişik yaş grupları:**
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda kullanımı ile ilgili ek bir bilgi bulunmamaktadır.
- **Özel kullanım durumları**
Özel kullanım durumları hakkında ek bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer VAGI-HEX®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla VAGI-HEX® kullandıysanız:

Vajinal bölgeye uygulanan lokal preparatlarda doz aşımı kolayca mümkün değildir. Eğer birkaç tablet aynı anda kuru vajinaya yerleştirilirse iyice çözünmeyecektir. Vajina içinde fazla sıvı mevcutsa, etken madde bu sıvı ile dışarı da akabilir.

VAGI-HEX®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VAGI-HEX®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VAGI-HEX® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VAGI-HEX®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.

- Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide 1'den daha fazla
- Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide 1'den daha fazla
- Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1'den daha fazla
- Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1'den daha fazla
- Çok seyrek: İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek olarak vajinal bölgede kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık ve ağrı görülebilir. Ancak bu belirtiler genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmez.

Dirençli mantarların üremesinde artış görülebilir. Bu nedenle uygun bir takip gereklidir. Süper enfeksiyon durumunda ilaç kesilmeli ve uygun bir tedaviye başlanmalıdır.

Bunlar VAGI-HEX®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VAGI-HEX®'in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 2-8°C sıcaklıkta, buzdolabında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VAGI-HEX®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul

Üretim Yeri: Drossapharm AG, İsviçre adına, Artesan, Almanya tarafından üretilmektedir.

*Bu Kullanma Talimatı onaylanmıştır.
(gün, ay ve yıl)*