

## KULLANMA TALİMATI

**NİDAZOL® 50 mg/5 ml oral süspansiyon**  
Ağızdan alınır.

**Etkin madde:** Her 5 ml'de 50 mg metronidazole eşdeğer 80.4 mg metronidazol benzoat içerir.  
**Yardımcı maddeler:** Metilparaben, propilparaben, magnezyum alüminyum silikat, şeker (sukroz), sodyum sakkarin dihidrat, monosodyum fosfat dihidrat, portakal esansı (deterpene), etil alkol, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. *NİDAZOL nedir ve ne için kullanılır?*
2. *NİDAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *NİDAZOL nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *NİDAZOL'ün saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. NİDAZOL nedir ve ne için kullanılır?**

NİDAZOL, metronidazol benzoat adı verilen bir etkin madde içerir. Bu ilaç, antibiyotikler adı verilen bir gruba dahildir.

Vücudunuzda enfeksiyona yol açan bakterileri ve parazitleri öldürür.

Bu ilaç aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- *Giardia lamblia* (*G. intestinalis*)'nin (bir bakteri türü) neden olduğu giardiyaz (parazitin neden olduğu bir hastalık) tedavisinde,
- Postoperatif (ameliyat sonrası) anaerobic (oksijensiz solunum) bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde,
- Duyarlı anaerob (oksijensiz solunum) bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların

tedavisinde.

NİDAZOL 100 ml'lik şişelerde, 5 ml'lik kaşık ile piyasaya sunulmaktadır.

Süspansiyon, krem-beyaz renkli, homojen (tek bir madde gibi görünen), viskoz (az akışkan, ağda), portakal esansı kokuludur.

## 2. NİDAZOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### **NİDAZOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Metronidazol, nitroimidazol (örn.; tinidazol) veya içeriğindeki yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

### **NİDAZOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Karaciğer hastalığınız varsa ya da daha önce bu tür bir hastalık geçirmiş iseniz
- Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz alıyorsanız
- Sinir sisteminiz ile ilgili bir hastalığınız varsa
- Cockayne sendromu (nadir görülen kalıtsal bir hastalık) olan hastalarda ölümcül sonuçlara neden olabilen ciddi karaciğer / akut karaciğer yetmezliği vakaları bildirilmiştir. Cockayne sendromunuz varsa, NİDAZOL ile tedavi edilirken ve tedaviden sonra doktorunuz karaciğer fonksiyonunuzu izleyecektir.
- NİDAZOL, idrar renginizi koyulaştırabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **NİDAZOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması**

NİDAZOL kullanırken ve kullanmayı bıraktıktan sonraki 48 saat boyunca alkollü içecek kullanmayınız. NİDAZOL kullanırken alkol tüketimi mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ateş basması, çok hızlı veya düzensiz kalp çarpıntısı (palpitasyon) ve baş ağrısı gibi istenmeyen yan etkilere yol açabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız NİDAZOL kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz. Kullanılması kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde NİDAZOL kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.*

Eğer emziriyorsanız NİDAZOL kullanmamanız gereklidir. Bunun sebebi, ilacın küçük miktarlarda da olsa anne sütüne geçmesidir.

## **Araç ve makine kullanımı**

NİDAZOL tedavisi sırasında uyukuluk hali, baş dönmesi, kafa karışıklığı, olmayan nesnelere görülmesi veya olmayan seslerin duyulması (halüsinasyonlar), kriz (konvülsiyon) veya geçici görme problemleri (bulanık veya çift görme gibi) ortaya çıkabilir. Eğer bu yan etkiler sizde de görülürse araç ve makine kullanmayınız.

## **NİDAZOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün az miktarda (her ölçekte 100 mg'dan az) etil alkol (alkol) içerir.

Bu tıbbi ürün her 5 ml'sinde 1,155 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

## **Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı**

Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bunlara bitkisel takviyeler dahil olmak üzere reçetesiz ilaçlar da dahildir. Bunu sebebi, NİDAZOL'ün diğer ilaçların etkililiğini engelleyebilecek olmasıdır. Ayrıca bazı ilaçlar da NİDAZOL'ün etkililiğini etkileyebilir.

Eğer aşağıda verilen ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

- Varfarin (kan sulandırıcı olarak kullanılır)
- Lityum (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır)
- Fenobarbital veya fenitoin (sara hastalığı tedavisinde kullanılır)
- 5-florourasil (kanser tedavisinde kullanılır)
- Busulfan (lösemi -kan kanseri- tedavisinde kullanılır)
- Siklosporin (organ nakli sonrasında organ reddinin önlenmesi için kullanılır)
- Disülfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır)

## **Testler**

Eğer ilacın 10 günden daha uzun süredir kullanıyorsanız doktorunuz sizden bazı testler isteyebilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. NİDAZOL nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım doz / uygulama sıklığı için talimatlar**

NİDAZOL'ü her zaman doktorunuzun size belirttiği şekilde kullanınız. Tedavi kürünü tamamlamanız önemlidir. Tedavi kürünün uzunluğu sizin ihtiyacınıza ve hastalığın tedavi edilmesine bağlıdır.

Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınız ile iletişime geçiniz.

- NİDAZOL süspansiyon ağız yolu ile uygulanır.

• NİDAZOL için uygun doz sizin ihtiyacınıza ve hastalığınızın tedavisine bağlıdır.

- Tedavi süreniz hastalığınız çeşidine ve ne kadar ileri seviyede olduğuna bağlıdır.
- Doktorunuz veya eczacınız NİDAZOL süspansiyonunuzu seyreltebilir. Bu durumda ilacınızı eczacınızın ambalaj üzerine düştüğü nota uygun olarak kullanmalısınız.

Yetişkinler ve çocuklar için günlük doz aşağıdaki gibidir:

### **Bazı bakteri enfeksiyonlarının tedavisi**

#### **10 – 12 yaş arası çocuklar**

- Her 8 saatte bir 400 mg NİDAZOL süspansiyon alınız.

#### **Çocuklar ve bebekler**

- Doktorunuz, kilosuna bağlı olarak çocuğunuzun doz miktarını belirleyecektir.
- İlaç dozu 8 saatte bir uygulanmalıdır.
- Eğer bebeğiniz 8 haftalıktan daha küçük yaştaysa, doktorunuz çocuğunuza günlük doz veya 12 saatte bir tekrarlanan ikili doz verecektir.

### **Ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonların önlenmesi**

#### **Çocuklar**

- NİDAZOL Süspansiyon'u çocuğunuza ameliyattan 2-3 saat önce veriniz.
- Doktorunuz, kilosuna bağlı olarak çocuğunuzun doz miktarını belirleyecektir.

### **Diğer enfeksiyon çeşitleri**

Parazitler veya bazı bakteriler tarafından oluşan diğer enfeksiyonların tedavisi için ne kadar NİDAZOL süspansiyon kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir. Bunu hastalığınızın çeşidi ve ne kadar ileri derecede hasta olduğunuz belirleyecektir. Ambalajın üzerinde yazan eczacı notunda NİDAZOL süspansiyonu ne kadar sıklıkta ve ne zaman kullanmanız gerektiği belirtilecektir.

### **Uygulama yolu ve metodu**

Ağız yoluyla alınır.

### **Özel kullanım durumları**

#### **Diyaliz hastaları**

Böbrek diyalizi NİDAZOL'i kandan uzaklaştırır. Eğer diyaliz hastasıysanız bu ilacı diyaliz tedavinizden sonra kullanmalısınız.

### **Karaciğer yetmezliği olan hastalar**

Doktorunuz size daha düşük doz veya daha az sıklıkta ilaç uygulaması önerebilir.

*Eğer NİDAZOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla NİDAZOL kullandıysanız**

NİDAZOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanırsanız doktorunuza söyleyiniz veya en yakın hastanenin acil servisine gidiniz. Kutu ve şişeyi yanınızda götürünüz. Böylece doktorunuz ne almış olduğunuzu bilecektir.

*NİDAZOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **NİDAZOL'ü kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Eğer bir NİDAZOL dozunu unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Ancak bir

sonraki doz saatiniz yaklařtıysa, o zaman unuttuđunuz dozu almayıp bir sonraki dozu alın.

### **NİDAZOL ile tedavi sonlandırıldıđındaki oluřabilecek etkiler**

Metronidazol tedavisinin kesilmesi sonrasında herhangi olumsuz bir etki oluřmaz.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi NİDAZOL'un içeriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkiler olabilir.

#### **Ařađıdakilerden biri olursa, NİDAZOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bařvurunuz:**

- Ellerinizde, ayaklarınızda, eklemlerinizde, yüzünüzde, dudaklarınızda ya da solunum zorluđu veya yutma güçlüğüne yol açabilecek řekilde bođazınızda řiřme olursa. Aynı zamanda kařıntılı, pütürlü bir döküntü (kurdeřen) veya yanmalı bir kařıntı (ürtiker) olduđunu da fark edebilirsiniz.  
Bu durum, sizde NİDAZOL'e karřı alerjik bir reaksiyon geliřtiđinizi gösterir.
- řiddetli ancak çok seyrek görülen bir etki de ensefalopati denilen bir çeřit beyin hastalıđıdır. Belirtiler farklılık gösterir ama ateřiniz, ense sertliđiniz, bař ađrınız olabilir ya da var olmayan sesler duyabilirsiniz. Aynı zamanda elleriniz ve ayaklarınızı kullanmakta zorluk çekebilir, konuřmakta zorlanabilir ya da sersemlik hissedebilirsiniz.
- Dudak, göz, ađız, burun veya genital bölge etrafında kabarcıklı, soyulan veya kanayan deri kařıntısı oluřabilir. Grip benzeri belirtileriniz veya ateřiniz olabilir. Bunlar Steven Johnson Sendromu veya toksik epidermal nekroliz adı verilen hastalıkların belirtileridir.

#### **Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bařvurunuz:**

- Cilt ve gözlerde sarımsı görünüm. Bu durum, bir karaciđer hastalıđına iřaret edebilir (sarılık).
- Beklenmedik enfeksiyonlar, ađızda yaralar, berelenmeler, diř etinde kanama veya ařırı yorgunluk. Bu durum, bir kan sorunu nedeniyle ortaya çıkabilir.
- Sırtınıza yansıyan řiddetli karın ađrısı (pankreatit)

Yan etkiler ařađıdaki kategorilerde gösterildiđi řekilde sınıflandırılmıřtır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

#### **Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:**

##### **Çok seyrek olarak (10 000'de 1 kiřiden az gözlenir)**

- Nöbetler (konvülsiyon)
- Sersemlik hissi ve var olmayan řeyleri duyma ya da görme (halüsinasyonlar) gibi zihinsel sorunlar
- Bulanık veya çift görme gibi göz problemleri
- Cilt döküntüsü ya da kızarması
- Bař ađrısı

- İdrar renginde koyulaşma
- Uykulu hal ya da baş dönmesi
- Kas veya eklemlerde ağrı
- Hayati tehlike oluşturan karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer problemleri (hepatoselüler karaciğer bozukluğu)

**Sıklığı bilinmiyor (eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor)**

- Kollar ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma, ağrı veya yorgunluk
- Ağızda hoş olmayan tat
- Paslı dil
- Mide bulantısı, kusma, mide rahatsızlığı, karın ağrısı veya ishal
- İştah kaybı
- Ateş
- Ruhsal çökkünlük hissi
- Gözlerde ağrı (optik nörit)
- Ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, ense sertliği ve ışığa aşırı hassasiyet gibi bir grup belirtinin birlikte olması. Bu durum, beyin ve omuriliği saran zarın iltihabı sonucu ortaya çıkmış olabilir (menenjit).
- Duyma bozukluğu/kaybı
- Kulaklarda çınlama (tinnitus)
- Her ilaç alındığında sıklıkla aynı bölgede ortaya çıkan kabarcıklı veya kabarcıksız kaşıntı veya deri renk değişikliği

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. NİDAZOL’ü saklanması**

*NİDAZOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Kendi ambalajında, ışıktan uzak kalacak bir yerde saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Dış kutu üzerinde basılı bulunan son kullanma tarihinden sonra NİDAZOL’ü kullanmayınız.*

Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat sahibi:** İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak  
Office Building Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul

**Üretim yeri:** İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010) Topkapı  
– İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı 02/04/2019 tarihinde onaylanmıştır.*