

KULLANMA TALİMATI

LEKARNİTİN 1 g/ 5 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul
Damar içine uygulanır.

- *Etkin madde:* Her bir 5 ml'lik ampul etkin madde olarak, 1 g L-karnitin içerir.
- *Yardımcı madde(ler):* Hidroklorik asit (3N) ve enjeksiyonluk steril su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **LEKARNİTİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **LEKARNİTİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **LEKARNİTİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **LEKARNİTİN'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. LEKARNİTİN nedir ve ne için kullanılır?

- LEKARNİTİN, L-karnitin adlı etkin maddeyi içeren bir ilaçtır. L-karnitin, memelilerin enerji metabolizması için zorunlu olan doğal bir maddedir. Özellikle kalp kası ve iskelet kasları gibi dokular için gerekli olan enerji üretimini sağlamak üzere yağ asitlerinin mitokondri (bir hücre içi organeli) girişini kolaylaştırır.
- LEKARNİTİN, 5 ml'lik amber renkli ampuller şeklinde sunulur. Berrak, renksiz veya açık sarı renkli çözelti görünümündedir.
- LEKARNİTİN, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
 - Birincil karnitin yetersizliği,
 - Hemodiyaliz uygulanan hastalarda görülen karnitin yetersizliği.

2. LEKARNİTİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEKARNİTİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

- Eğer LEKARNİTİN'in içeriğinde bulunan L-karnitin'e ya da herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.

LEKARNİTİ

• İnsülin veya alan şeker hastası olabilir. Bu hastaların

• Damar yoluyla tedavi alamayacak du

• LEKARNİTİ belirtilerini, kontrol edebili

• Damar yoluyla yetmezliğiniz, türevi veya tedavinize potansiyel

• Diyaliz hastaları böbrekler yoluyla [TMA] ve trimetoprim formülasyonları nefeste ve tıbbi durum, damar tıkanıklığı

• LEKARNİTİ (varfarin) kullanırken, nedenle, değerler testlerin) başlatılmalıdır

Bu uyarılar ę doktorunuza danışın

LEKARNİTİ

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanma

Hamilelerde y kadınlarla yal durumunda kul

Tedaviniz sırasında danışınız.

Emzirme

İlacı kullanma

LEKARNİTİN risklerden üstü

