

## KULLANMA TALİMATI

### DUOVEL 40 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

•**Etkin madde:** Famotidin 40 mg

•**Yardımcı maddeler:** Prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz (PH 101), magnezyum stearat, talk, opadry II Brown 33G26701.

Opadry II Brown 33G26701 ; Hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit, sarı demiroksit, laktöz monohidrat, PEG 3000, HPMC 6 cP/kırmızı demir oksit ve triacetin içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. DUOVEL nedir ve ne için kullanılır?**
  - 2. DUOVEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
  - 3. DUOVEL nasıl kullanılır?**
  - 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
  - 5. DUOVEL'in saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DUOVEL nedir ve ne için kullanılır?**

DUOVEL etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.

DUOVEL 30 ve 60 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

DUOVEL, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

- Mide (gastrik) ve ince barsağımızın ilk bölümündeki (duodenal) ülserlerin tedavi edilmesi ve tekrarının önlenmesi için,
- Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu (gastroözofageal reflü gibi) durumları tedavi etmek için ve tekrarlarını önlemek için,
- Midenin çok fazla miktarda asit salgılamasından kaynaklanan Zollinger Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenoma gibi hastalık durumlarında kullanılır.

#### **2. DUOVEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**DUOVEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- DUOVEL'de bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa
- Ayrı ilaç grubundan (H<sub>2</sub>- reseptör blokerleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz

## **DUOVEL'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer;

- Ađır bbrek yetmezliđiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha dřk dozda almanızı isteyebilir.
- DUOVEL tedavisi ile sađlanacak belirtilerdeki iyileřme midede kt huylu tmr olasılıđını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle DUOVEL tedavisine bařlanmadan nce doktorunuz bu tr bir hastalık olasılıđının ortadan kaldırılması iin gerekli incelemeyi yapmalıdır.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **DUOVEL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

DUOVEL'in her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedike đnlerle birlikte veya đn aralarında alınmaları bakımından bir kısıtlama yoktur. Tabletleri paralamayınız veya iđnemeyiniz.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

DUOVEL'i ancak doktorunuzun nerdiđi durumlarda kullanmalısınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

DUOVEL anne stne geer. Emzirilen bebeđe zarar verip vermeyeceđi bilinmemektedir. Eđer emziriyorsanız DUOVEL kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı zerine bilinen bir etkisi yoktur.

### **DUOVEL' in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

DUOVEL'in ieriđinde bulunan yardımcı maddelere karřı bir duyarlılıđınız yoksa, bu maddelere bađlı olumsuz bir etki beklenmez.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

DUOVEL'in genellikle diđer ilalarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandıđımız btn ilaları yine de doktorunuza bildiriniz. zellikle ařađıdaki ilalardan herhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:

- Ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonları iin kullanılır)
- Probenesid (gut iin kullanılır)
- Atazanavir (HIV tedavisi iin kullanılır)
- Mide asidini ntralize eden ilalar (alminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)
- Sukralfat (mide ve on iki parmak barsađı lserlerinde kullanılır)

*Eđer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. DUOVEL nasıl kullanılır?

#### Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DUOVEL'i doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:

- Duodenal ülser ve gastrik ülser:

Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıtı göre değişebilir. Ülserin tekrarlamasını önlemek için devam dozu gece yatmadan önce alınan 20 mg' dır.

- Gastroözofageal reflü (GÖRH):

Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

- Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşırı salgılama hallerinde ):

Doz hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg'dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

#### Uygulama yolu ve metodu:

DUOVEL sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla (120 ml) birlikte çiğnmeden ya da ezmeden yutunuz.

#### Değişik yaş grupları:

**Çocuklarda kullanımı:** Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

**Yaşlılarda kullanımı:** Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

#### Özel kullanım durumları

##### Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

*Eğer DUOVEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### Kullanmanız gerekenden daha fazla DUOVEL kullandıysanız:

*DUOVEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### DUOVEL'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### DUOVEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DUOVEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

yaygın değil : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

#### Yaygın

- Baş ağrısı, sersemlik hissi
- Kabızlık, ishal

#### Yaygın olmayan

Eğer alerjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, DUOVEL almayı kesiniz ve acilen doktorunuza başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

- Yüz, dudaklar, dil ve boğazınızda şişme (solunma ve yutkunmada güçlük ile birlikte)
- Ürtiker (kurdeşen)

Diğer yaygın olmayan yan etkiler:

- Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
- Bulantı, kusma, karında ağrı veya şişkinlik, gaz
- Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
- İştahsızlık
- Bitkinlik

#### Seyrek

• Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir ancak kontrollü klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır.

#### Çok seyrek

- Hırıltılı solunum ve yutkunmada güçlük
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi, anjiyönötik ödem, bronkospazm)
- Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılarında normalden farklılık ortaya çıkması
- Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.
- Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) {özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk
- DUOVEL'in bulunduğu ilaç grubu olan H<sub>2</sub> reseptör antagonistlerinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri
- Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)
- Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sarılık
- Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı

verilen ciddi cilt reaksiyonları

- Eklem ağrısı, kas krampları
- İktidarsızlık, libido azalması

#### Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0800 3140008 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. DUOVEL'in Saklanması**

DUOVEL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUOVEL 'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *DUOVEL 'i kullanmayınız.*

**Ruhsat sahibi:** Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
34460 İstinye - İstanbul

**Üretim yeri** : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
34580 Silivri – İstanbul

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*