

## KULLANMA TALİMATI

### **BENİFLEX® jel %5** **Haricen uygulanır.**

- **Etkin madde:** 50 g jel içinde 2,5 g benzidamin HCl bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** İsopropil alkol, gliserin, hidroksietil selüloz, lavanta esansı ve deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **BENİFLEX® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BENİFLEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BENİFLEX® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BENİFLEX®'in saklanması**

### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. BENİFLEX® nedir ve ne için kullanılır?**

- BENİFLEX®, yangı önleyici ve yangı önleyici etkisine bağlı olarak ağrı kesici özelliklere sahip bir non-steroid antiinflamatuvar ilaçtır (NSAİİ; steroid yapıda olmayan yangıyı önleyen ilaç).
- BENİFLEX®, 50 g'lık, alüminyum tüp ambalajlarda sunulur. Renksiz, berrak jeldir. Kolay yayılır ve lavanta kokusu duyulur.
- BENİFLEX®, muhtelif sebeplerle (cerrahi, travmatik, fizik vs.) meydana gelen yumuşak doku zedelenmelerine bağlı lokal ödem (vücutta sıvı birikimi), yangı ve buna bağlı aşağıda belirtilen ağrılı durumların tedavisinde kullanılır:
  - Bursit (eklem keselerinin yangısı),
  - Tendinit (kasları kemiğe bağlayan yapılar olan tendonların yangısı),
  - Kas ağrısı,
  - Sırt ve bel ağrısı,
  - Burkulma,
  - Ezik,
  - Kas gerilmesi vs.

## 2. BENİFLEX®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### BENİFLEX®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer BENİFLEX®'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.

### BENİFLEX®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- BENİFLEX®'i cilt bütünlüğünün bozulmuş olduğu açık yaralara sürmeyiniz,
- Diğer haricen uygulanan ilaçlarda olduğu gibi uzun süreli kullanılmasının hassaslaşmaya sebep olabileceğini göz önünde bulundurunuz,
- Gözler ve mukozal yüzeylerle (ağız içi ve burun içi mukozası gibi) temasından kaçınınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### BENİFLEX®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BENİFLEX®'in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

### Hamilelik

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Yeterli klinik deneyim bulunmadığından BENİFLEX®'i hamilelik sırasında kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### Emzirme

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emziren kadınlarda yeterli sayıda çalışma olmadığından emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

### Araç ve makine kullanımı

BENİFLEX®'in topikal kullanımı, araç ve makine kullanma becerinizi etkilemez.

### Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BENİFLEX® ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## 3. BENİFLEX® nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:** Hasta bölgeye ve/veya civarına hafif ovarak günde 2-3 defa sürülür. Tüpten dışarı sıkılacak jel miktarı yarım ya da bir parmak uzunluğunda (1-2 g) olmalıdır.

Tedavi süresi cerrahi travmalarda 3-5 gün, diğer travmatik durumlarda 5-7 gündür. Doktorunuz BENİFLEX® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

- **Uygulama yolu ve metodu:** Hasta bölgeye ve/veya civarına hafif ovarak sürülür.

- **Değişik yaş grupları**

**Çocuklarda kullanımı:** Çocuklarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

**Yaşlılarda kullanımı:** Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

- **Özel kullanım durumları:** Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

*Eğer BENİFLEX®'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla BENİFLEX® kullandıysanız**

*BENİFLEX®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **BENİFLEX®'u kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **BENİFLEX® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bilinmemektedir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, BENİFLEX®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek (10.000 hastada 1'den fazla ve 1.000 hastada 1'den az) olarak görülen yan etkiler:

- Cilt tahrişine bağlı kaşıntı
- Kızarıklık
- Deride içi sıvı dolu kabarcıklar
- Işığa karşı duyarlılık reaksiyonları

Yukarıda belirtilen yan etkilerin ilaç kesilince kaybolduğu bildirilmiştir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. BENİFLEX®'in saklanması**

*BENİFLEX®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra BENİFLEX®'i kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Faks: (+90 212) 222 57 59

**Üretim Yeri:** Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44

*Bu kullanma talimatı ..././... tarihinde onaylanmıştır.*