

## KULLANMA TALİMATI

### **PANTHERO 50 mikrogram inhaler kapsül**

Yutulmaz. Kutudan çıkan inhaler (İnhalasyon cihazı) aracılığıyla ağızdan solunarak kullanılır.

**Etkin madde:** Her kapsül 50 mikrogram glikopironyuma eşdeğer miktarda 63 mikrogram glikopironyum bromür içerir. Her inhalasyonda ağızlıktan 44 mikrogram glikopironyum dağılır.

**Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, hipromelloz, saf su, karragenan, potasyum klorür, Sunset Yellow FCF(E110), şellak (E 904), susuz etil alkol, izopropil alkol, propilen glikol, N-Bütül alkol, amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, siyah demir oksit (E 172)

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı doktorunuza kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **PANTHERO nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PANTHERO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PANTHERO nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PANTHERO'nun saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. PANTHERO nedir ve ne için kullanılır?**

PANTHERO glikopironyum bromür olarak adlandırılan bir etkin madde içerir. Bu ilaç bronkodilatörler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Soluduğunuzda, daha kolay nefes almanıza yardımcı olur.

PANTHERO ambalajınızda, bir inhalasyon cihazı ve inhalasyon tozu halinde ilaç içeren kapsüller (blister folyolarda) bulacaksınız. İnhalasyon cihazı kapsül içindeki ilacı solumanızı sağlar.

PANTHERO, 30 kapsüllük blister ambalajlarda bulunmaktadır.

Her kutunun içinde, ilacı içinize çekmenizi sağlayan cihaz (İnhalasyon cihazı) ile blisterler içinde bu cihaza yerleştirerek kullanacağınız, ilacı toz olarak içeren kapsüller bulunmaktadır.

Bu ilacı, sadece bu ambalajda bulunan inhalasyon cihazı (inhaler) ile kullanınız.

PANTHERO kronik tıkalı akciğer hastalığı (KOAH) olarak adlandırılan bir akciğer hastalığından dolayı solunum zorluğu yaşayan hastaların daha kolay nefes almasını sağlamak için kullanılır. Soluduğunuzda, daha kolay nefes almanıza yardımcı olur.

PANTHERO'yu günde bir kez kullanırsanız, KOAH'ın günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

KOAH'da solunum yolları çevresindeki kaslar daralır, solunumu zorlaştırır. PANTHERO akciğerlerdeki bu kasların daralmasını engelleyerek, havanın akciğerlere giriş çıkışını kolaylaştırır.

PANTHERO, orta ve ağır KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastalarında düzenli kullanıldığında atak sıklığını azaltmakta, hastalık belirtilerini ve yaşam kalitesini düzeltebilmektedir. Uzun dönemdeki FEV1 düşüşünü ise değiştirmemektedir.

PANTHERO'nun nasıl iş gördüğü ya da bu ilacın neden size reçete edildiği hakkında sorularınız varsa doktorunuzdan yanıtlanmasını isteyiniz.

## **2. PANTHERO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **PANTHERO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

Eğer:

- Glikopironyum brmür ve ya içeriğindeki diğer maddelere alerjik iseniz.

### **PANTHERO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

Aşağıdakilerden herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, PANTHERO kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz:

- Böbrek problemlerinizi varsa,
- Dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) olarak adlandırılan bir göz probleminiz varsa,
- İdrar yaparken zorlanıyorsanız.

### **PANTHERO ile tedavi sırasında:**

- PANTHERO kullandıktan hemen sonra göğüste daralma hissi, öksürme, hırıltı ya da nefes daralması (bronkospazm belirtileri) yaşıyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.
- Göz ağrısı ya da rahatsızlığı, görüşte geçici bulanıklık, haleler görme veya kırmızı gözle ilişkili renkli görüntüler durumunda PANTHERO kullanmayı bırakarak derhal doktorunuza arayınız; bunlar akut dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) krizinin belirtileri olabilir.

PANTHERO, KOAH'ınız için idame tedavisi olarak kullanılır. PANTHERO'yu ani nefes darlığı krizi veya hırıltı için kullanmayınız.

Doktorunuzun tüm talimatlarına uyunuz. Bunlar, bu kullanma talimatının içerdiği genel bilgilerden farklı olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

**PANTHERO'nun yiyecek ve iecek ile kullanılması:**

PANTHERO'yu yiyecek ya da iecek tüketiminden önce veya sonra inhalasyon yoluyla kullanabilirsiniz.

**Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Gebeyseniz ya da gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz PANTHERO'yu kullanıp kullanamayacağınız konusunu sizinle konuşacaktır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

**Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İeriğindeki aktif maddenin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz PANTHERO'yu kullanıp kullanamayacağınız konusunu sizinle konuşacaktır.

**Ara ve makine kullanımı**

Klinik alışmalarda, PANTHERO'nun ara ve makine kullanımını etkilediğine ya da zihinsel yeteneği bozduğuna dair herhangi bir gösterge yoktur.

**PANTHERO'nun ieriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

PANTHERO laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Akciğer hastalığı için kullanılan ipratropium, oksitropium veya tiotropium gibi (antikolinerjikler olarak da adlandırılır) PANTHERO'ya benzer ilaçları kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

**3. PANTHERO nasıl kullanılır?****Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

PANTHERO'yu her zaman doktorunuzun ya da eczacınızın talimatları doğrultusunda kullanınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Normal doz her gün bir kapsül ieriğinin solunmasıdır. Doktorunuzun söylediğinden daha fazla ilaç kullanmayınız.

PANTHERO 24 saat kalıcı olduğundan, nefes almanıza yardımcı olması için günde sadece bir kez solumaya ihtiyacınız vardır. PANTHERO'yu her gün aynı saatte almak, ilacı kullanmayı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

**Uygulama yolu ve metodu:**

Bu kutuda, bir inhalasyon cihazı ve inhalasyon tozu formunda ilaç ieren kapsüller (blisterler iinde) bulacaksınız.

Bir kapsüldeki tozu solumak için sadece bu kutuda yer alan inhalasyon cihazını kullanınız (inhalasyon cihazı).

Kapsülleri yutmayınız.

Kapsüller daima blisterlerinin içinde saklanmalı ve kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.

Yeni bir kutuya başladığımızda, bu yeni kutuda temin edilen yeni inhalasyon cihazını kullanınız.

Her bir inhale 30 günlük kullanımdan sonra imha ediniz.

İnhalasyon cihazınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için, bu kullanma talimatının sonunda yer alan talimatları mutlaka okuyunuz.

### **Değişik yaş grupları**

#### **Çocuklarda kullanım:**

18 yaş altındaki çocuklarda ve ergenlerde PANTHERO kullanılmamalıdır.

#### **Yaşlılarda kullanım:**

75 yaş ve üzerinde iseniz PANTHERO'yu diğer yetişkinler ile aynı dozda kullanabilirsiniz.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek /Karaciğer yetmezliği :**

PANTHERO hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen dozda kullanılabilir. Şiddetli böbrek yetmezliği veya diyaliz gerektiren son evre böbrek hastalığı olan hastalarda PANTHERO sadece beklenen faydalar olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır.

Karaciğer bozukluğu olan hastalara özel çalışma yapılmamıştır. PANTHERO başlıca böbrekten atılarak temizlendiğinden, karaciğer yetmezliği olan hastalarda bir maruziyet artışı beklenmemektedir.

PANTHERO'yu doktorunuzun kullanmanızı söylediği süre boyunca kullanınız.

KOAH uzun vadeli bir hastalık olup, PANTHERO'yu sadece nefes alma problemleri veya diğer KOAH belirtileri görülüşünde değil, her gün kullanmalısınız.

PANTHERO'yu ne kadar süre boyunca kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

*Eğer PANTHERO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla PANTHERO kullandıysanız**

*PANTHERO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Çok fazla PANTHERO kullandıysanız veya bir başkası kaza sonucu sizin ilacınızı kullandıysa, derhal tavsiye için bir doktoru veya hastaneyi arayınız. PANTHERO ambalajını gösteriniz. Tıbbi yardım gerekli olabilir.

## **PANTHERO'yu kullanmayı unutursanız**

Bir dozu almayı unutursanız, bu dozu mümkün olan en kısa sürede alınız, ancak aynı gün iki doz kullanmayınız. Bir sonraki dozu olağan saatinde alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **PANTHERO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

PANTHERO ile tedavinizi durdurmak hastalığınızın kötüleşmesine neden olabilir. Doktorunuz size söylemedikçe ilacınızı almayı bırakmayın.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, PANTHERO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen	:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

### **Bazı yan etkiler ciddi olabilir**

*Bu yan etkiler yaygın değildir (100 kişide en fazla 1 kişiyi etkiler):*

- Düzensiz kalp atışı (atriyal fibrilasyonun (kalpte bir çeşit atım bozukluğu) olası işaretleri),
- Yüksek kan şekeri düzeyi (hiperglisemi; tipik belirtiler aşırı susama veya açlık ve sık idrara çıkmayı kapsamaktadır).

Eğer bunlardan herhangi birisini yaşarsanız, hemen doktorunuza bildiriniz.

### **Yaygın:**

- Ağız kuruluğu,
- Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı (gastroenteritin (ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu) olası belirtileri),
- Uyuma güçlüğü,
- Akan veya tıkanmış burun, aksırma (rinit (nezle) ),
- Boğaz ağrısı,
- Kas-iskelet ağrısı,
- Boyun ağrısı.

### **Yaygın olmayan:**

- Öğünlerden sonra mide rahatsızlığı (dispepsinin (hazımsızlık) olası belirtileri),
- Diş çürükleri,
- Uzunlarda ağrı (örneğin kollar ya da bacaklar),
- Göğüs kasları, kemikleri ya da eklemlerinde ağrı,
- Döküntü,
- Yorgunluk,
- Güçsüzlük,

- Yanaklar ve alında basınç veya ağrı hissetme (sinüs tıkanıklığının olası belirtileri),
- Balgamlı öksürük,
- Boğaz tahrişi,
- Burun kanamaları,
- Ağrılı ve sık idrara çıkma (sistitin (idrar kesesi (mesane) iltihabı) olası belirtileri),
- İdrar çıkışında güçlük ve ağrı (dizüri (ağrılı idrar yapma) olası belirtileri),
- Çarpıntı,
- Uyuşma.

75 yaş üzerindeki bazı yaşlı hastalar aynı zamanda baş ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonu yaşayabilir.

Bu durumlardan herhangi biri sizi şiddetli derecede etkiliyorsa, doktorunuza söyleyiniz.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz .*

### **Yan etkilerin raporlanması**

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

### **5. PANTHERO’nun saklanması**

*PANTHERO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız ve yalnızca kullanımdan hemen önce açınız.

Her bir inhaler 30 günlük kullanımdan sonra imha edilmelidir.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PANTHERO’yu kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *PANTHERO’yu kullanmayınız.*

### **Ruhsat sahibi:**

Farmanova Sağlık Hizmetleri  
Suryapı & Akel İş Merkezi  
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:6 34805  
Kavacık – Beykoz İSTANBUL

**Üretim yeri:** Novartis Pharma Stein AG  
Stein – İsviçre

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*

## PANTHERO İNHALER KAPSÜLLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN TALİMATLAR


Kullanma talimatının bu bölümünde, inhalasyon cihazınızı nasıl kullanacağınız ve bakımını nasıl yapacağınız açıklanmaktadır. Lütfen dikkatlice okuyunuz ve talimatları takip ediniz.

Ayrıca, bu kullanma talimatındaki **3. PANTHERO nasıl kullanılır?** Bölümünü inceleyiniz. Herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

### PANTHERO paketi:





Her bir PANTHERO paketi şunları içermektedir:






- bir inhalasyon cihazı
- inhalasyon cihazında kullanılacak PANTHERO kapsülleri içeren bir ya da daha fazla blister







- **Yalnızca bu kutu içinde bulunan inhalasyon cihazını kullanınız.** PANTHERO kapsüllerini başka bir inhalasyon cihazı ile birlikte kullanmayınız ya da inhalasyon cihazını başka bir kapsül ilacı almak için kullanmayınız.
- Her 30 gün kullanımdan sonra inhalasyon cihazını atınız. Artık gerekmeyen ilaçları ve inhalasyon cihazlarını nasıl imha edeceğinizi eczacınıza sorunuz.
- **Kapsülleri yutmayınız.** Kapsüllerin içinde bulunan toz, soluyarak almanız içindir.

Kullanıma ilişkin talimatlar:

	<p><b>Kapağı çıkarın.</b></p>
	<p><b>İnhalasyon cihazını açın:</b> İnhalasyon cihazının tabanını sıkıca tutun ve ağızlığı eğerek inhalasyon cihazını açın.</p>
	<p><b>Kapsülü hazırlayın:</b> Blister kartındaki blisterlerden birini, tırtıklı kısımdan kopararak ayırın ve koruyucu kağıdı soyarak kapsülü çıkarın.</p> <p>Kapsülü folyodan basarak çıkarmayın.</p>
	<p><b>Bir PANTHERO inhaler kapsülü çıkarın:</b></p> <p>Kapsüller daima blisterde saklanmalı ve sadece KULLANIMDAN HEMEN ÖNCE çıkarılmalıdır.</p> <p>Kuru ellerle, kapsülü blisterden çıkarınız.</p> <p>PANTHERO inhaler kapsülü yutmayınız.</p>

<p><b>5</b></p> 	<p><b>Kapsülü yerleştirin:</b> Kapsülü kapsül haznesinin içerisine yerleştirin.</p> <p><b>Kapsülü hiçbir zaman doğrudan ağızlığa yerleştirmeyin.</b></p>
<p><b>6</b></p> 	<p><b>İnhalasyon cihazını kapatın:</b> İnhalasyon cihazını bir "klik" sesi duyacak şekilde tamamen kapatın.</p>
<p><b>7</b></p> 	<p><b>Kapsülün delinmesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İnhalasyon cihazını ağızlık kısmı yukarı bakacak şekilde dik tutun.</li> <li>• Her iki taraftaki düğmelere <b>aynı anda sıkıca basın</b>. Bu şekilde kapsül delinmiş olacaktır.</li> <li>• Kapsül delinirken bir "<b>klik</b>" sesi duyacaksınız.</li> </ul> <p><b>Delme düğmelerine bir kereden fazla basmayın.</b></p>
<p><b>8</b></p> 	<p><b>Delme düğmelerini tamamen serbest bırakın.</b></p>
<p><b>9</b></p> 	<p><b>Nefes verin:</b> Ağızlığı ağızınıza yerleştirmeden önce nefesinizi tam olarak verin.</p> <p><b>Asla ağızlığın içine üflemeyin.</b></p>

	<p><b>İlacı içinize çekin:</b> İçinize çekmeden önce;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İnhalasyon cihazını şekilde görüldüğü gibi tutun. Yandaki düğmeler sağa ve sola bakmalıdır (yukarıya ve aşağıya değil).</li> <li>• Ağızlığı ağızınıza yerleştirin ve dudaklarınız ile ağızlığın çevresini sıkı bir şekilde kapatın.</li> <li>• Hızlı, fakat kesintisiz ve olabildiğince derin bir nefes alın. <b>Delme düğmelerine basmayın.</b></li> </ul>
	<p><b>Not:</b> İnhalasyon cihazı aracılığıyla nefes alırken, kapsül hazne içinde dönecektir ve bu sırada bir 'vızıldama' sesi duymanız gerekir. İlaç akciğerlerinize doğru giderken ağızınızda şeker tadı hissedeceksiniz.</p> <p>Eğer bir vızıldama sesi duymazsanız kapsül, kapsül bölmesinde sıkışmış olabilir. Böyle bir durumun meydana gelmesi durumunda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İnhalasyon cihazını açın ve cihazın tabanına hafifçe vurarak dikkatlice kapsülü gevşetin. <b>Kapsülü gevşetmek için delme düğmelerine basmayın.</b></li> <li>• Gerekli olduğunda 9. ve 10. adımları tekrar edin.</li> </ul>
	<p><b>Nefesinizi tutun:</b> İnhalasyon cihazını ağızınızdan çıkarırken, 5-10 saniye ya da mümkün olduğunca uzun süre <b>nefesinizi tutun.</b> Daha sonra nefesinizi verin.</p> <p>Kapsül içinde toz kalıp kalmadığını kontrol etmek için inhalasyon cihazını açın. Eğer kapsülde toz kalmışsa inhalasyon cihazını kapatın ve 9., 10., 11. ve 12. adımları tekrarlayın. Hastaların büyük kısmı bir ya da iki inhalasyonda kapsülü boşaltabilmektedir.</p> <p>Bazı kişiler ilacı inhalasyon yoluyla aldıktan sonra nadiren kısa süre öksürebilmektedir. Eğer öksürürseniz endişelenmeyin. Kapsül boş olduğu sürece ilacınızı tam dozunda almış olacaksınız.</p>
	<p><b>Kapsülü çıkarın:</b> Günlük PANTHERO dozunu almayı bitirdikten sonra ağızlığı tekrar açın ve kapsül bölmesini eğerek boş kapsülü çıkartın. İnhalasyon cihazını kapatın ve kapağı yerine takın.</p> <p><b>Kapsülleri inhalasyon cihazı içinde saklamayın.</b></p>

## **UNUTMAYIN:**

- **PANTHERO kapsüllerini yutmayın.**
- **Yalnızca bu kutu içinde bulunan inhalasyon cihazını kullanın.**
- PANTHERO kapsülleri blister içinde saklanmalı ve yalnızca kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.
- Bir PANTHERO kapsülünü kesinlikle doğrudan inhalasyon cihazının ağızlığına yerleştirmeyin.
- Yandaki düğmelere birden fazla defa basmayın.
- İnhalasyon cihazının ağızlığının içine üflemeyin.
- İnhalasyondan önce yandaki düğmeleri serbest bırakın. İlacı içinize çektiğiniz sırada düğmeler basılı olmamalıdır.
- İnhalasyon cihazını asla su ile yıkamayın. Cihazı kuru tutun. Bkz. “İnhalasyon cihazı nasıl temizlenir?”.
- İnhalasyon cihazını parçalara ayırmayın.
- Her yeni PANTHERO ilaç kutusundan çıkan yeni inhalasyon cihazını kullanın.
- Kapsülleri inhalasyon cihazı içinde saklamayın.
- İnhalasyon cihazını ve PANTHERO kapsüllerini her zaman kuru bir yerde saklayın.

**İlave bilgiler:**

Nadiren kapsülün küçük parçacıkları eleđi geçerek ađzınıza gelebilir. Bu durumda parçacıkları dilinizin üzerinde hissedebilirsiniz. Bu parçacıkların yutulması ya da solunması zararlı deđildir. Eđer kapsül birden çok kez delinirse (bkz. 7. Adım) kapsülün parçalanma şansı artacaktır.

**İnhalasyon cihazı nasıl temizlenir?**

İnhalasyon cihazınızı asla su ile yıkamayınız. İnhalasyon cihazınızı temizlemek istiyorsanız, toz artıklarını uzaklaştırmak için, ađzlık kısmının içini ve dışını temiz, kuru, pamuksuz bir bezle siliniz. İnhalasyon cihazını kuru tutunuz.