

KULLANMA TALİMATI

WILKINSON % 12.5 Pomat

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her bir gram pomat 0,125 g Goudron Vegetal, 0,125 g kükürt içerir.

Yardımcı maddeler: Savonnoir, kalsiyum karbonat, vazelin ve lanolin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. **WILKINSON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **WILKINSON kullanman önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?**
3. **WILKINSON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **WILKINSON'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. **WILKINSON nedir ve ne için kullanılır?**

WILKINSON, kahverengi renkli homojen bir pomat olup, 100 gram pomat içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.

WILKINSON lokal antiseptik, antipruritik ve antiparaziter etkisinden dolayı uyuz hastalığı (scabies) tedavisinde kullanılır.

2. **WILKINSON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

WILKINSON' ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

- WILKINSON'ın bileşiminde bulunan etkin ve yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz). Eğer alerjik olup olmadığınızdan emin değilseniz lütfen doktorunuza danışınız.

Enfeksiyonlu, yanık ve çatlaklı deriye uygulanmamalıdır.

WILKINSON' ı ařađdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Haricen kullanım içindir. Yüz (göz, ađız ve mukoza membranları dahil), el ve ayak tabanları ve genital organlarda kullanımında dikkatli olunmalıdır. Alerjik reaksiyonlar nadiren görülür.

Ürünün içeriđinde bulunan kükürt, gümüş gibi metallerle temas etmesi sonrasında metalin renginin deđişmesine sebep olabilir. Cıva bileřikleri içeren ürünler ile birlikte kullanımında, kötü koku ve deride siyah lekeler oluşabilir.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

WILKINSON' ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu sebebiyle herhangi bir etkileřim beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

WILKINSON hamilelik döneminde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

WILKINSON emzirme döneminde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç kullanma becerisini etkilemesi beklenmez.

WILKINSON'ın içeriđine bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün lanolin ihtiva eder, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin kontak dermatit) sebebiyet verebilir.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

WILKINSON' ın diđer ilaçlarla bilinen bir etkileřimi yoktur.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. WILKINSON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaş üzeri çocuklarda ve erişkinlerde:

WILKINSON, hekim tarafından başka şekilde önerilmedikçe, hasta yıkanıp keselendikten sonra 3 gün süre ile her gün boyundan aşağı, hasta olmayan bölgelerde dahil olmak üzere ince bir tabaka halinde bütün vücuda ovularak sürülür.

Süre sonunda hasta yıkanmalı ve yüksek ısıda yıkanmış giyecekler giydirilmelidir. Temizlenen 'hasta ve kaşıntılı cilde' merhemın iyice nüfuz etmesi için ovularak sürülmesi tavsiye edilir. Merhemden çamaşırların kirlenmemesi için sürülen yerlerin üzerine naylon veya jelatin kağıdı ile örtülmesi tavsiye olunur.

• Uygulama yolu ve metodu:

WILKINSON sadece cilt üzerine uygulama içindir.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı:

6 ile 11 yaş arası çocuklarda: Erişkinlerde olduğu şekilde kullanılır.

6 yaş altındaki çocuklarda: 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı doktor kontrolünde ve dikkatli kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Erişkinlerde olduğu şekilde kullanılır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer WILKINSON'un çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla WILKINSON kullandıysanız;

WILKINSON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pratikte aşırı doz söz konusu değildir. Ancak kazara yutulmuşsa doktora başvurulmalıdır.

WILKINSON'u kullanmayı unutursanız;

Eğer dozunuzu zamanında almayı unuttursanız, mümkün olan en kısa zamanda uygulayınız, sonra tekrar normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

WILKINSON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
WILKINSON ile tedavinizi doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi *WILKINSON*'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek:

- Bölgesel tahriş (Lokal irritasyon)
- Cilt üzerinde akne benzeri lezyon (leke benzeri oluşumlar) oluşumu
- Deride hassasiyet
- Işığa duyarlılık
- Kıl, deri ve kumaşlarda lekelenme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. WILKINSON'un saklanması

WILKINSON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra WILKINSON kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Mega-Farma İlaç ve Kozmetik San. Tic. Paz. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Emin Sok. No:6 Flexkon Plaza K:1 D:1
Ümraniye-İstanbul
Telefon numarası: 0216 455 89 58
Faks numarası: 0216 455 89 59

Üretim yeri:

Merkez Laboratuvarı İlaç San.ve Tic.A.Ş.
Taşdelen Çamlık Mah., Ayça Sokak No:06
Çekmeköy / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı.....tarihinde onaylanmıştır.