

KULLANMA TALİMATI

BROMEKSİN Tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 8 mg bromeksın hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, talk, jelatin, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- * *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- * *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- * *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- * *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- * *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. BROMEKSİN Tablet nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. BROMEKSİN Tablet'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. BROMEKSİN Tablet nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. BROMEKSİN Tablet'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BROMEKSİN Tablet nedir ve ne için kullanılır?

BROMEKSİN Tablet, 50 tabletlik blister ambalajlarda sunulan ve etkin madde olarak 8 mg Bromeksın HCl içeren tabletlerdir.

BROMEKSİN Tablet, geçmeyen öksürüklerde balgam sökmekte zorlanılıyorsa, balgam sökücü olarak kullanılır.

2. BROMEKSİN Tablet'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BROMEKSİN Tablet'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bromeksın hidroklorür veya **BROMEKSİN Tablet'in** içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BROMEKSİN Tablet'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Mide ülseriniz var ise doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır..

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

BROMEKSİN Tablet'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek veya içeceklerle kullanılmasında herhangi bir sorun yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BROMEKSİN için, hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır.

Hayvan deneylerindeki tedavi dozlarında kullanıldığında fetüste herhangi bir hasar oluştuğuna dair kanıt bulunamamıştır.

Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BROMEKSİN Tablet az da olsa anne sütüne geçmektedir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Çok seyrek de olsa baş dönmesine sebep olabileceğinden, araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antitüssif (öksürük kesici) ve ifrazatı kurutan atropin ve benzeri ilaçlarla bir arada kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BROMEKSİN Tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar:

Ortalama günlük doz 3 defa 1 Tablet

Gerektiği zaman 3 defa 2 tablet kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

BROMEKSİN Tablet sadece ağızdan kullanım içindir. Bir bardak su ile alınır.

Çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. Tedaviye başladıktan sonra 14 günde belirtilerde düzelme olmaz veya şiddetlenirse doktora danışılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6–12 yaş arası çocuklarda günde 3 defa yarım tablet (toplam günde 12 mg)

2–6 yaş arası çocuklarda günde 2 defa çeyrek tablet (toplam günde 4 mg)

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Ađır karaciđer hastalarında doktor kontrolünde alınmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

BROMEKSİN Tablet çocuk hastalarda uygulama yolu ve metodu kısmında belirtildiđi gibi uygulanmalıdır. İki yařın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Eđer BROMEKSİN Tablet'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BROMEKSİN Tablet kullandıysanız:

BROMEKSİN Tablet'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BROMEKSİN Tablet'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BROMEKSİN Tablet ile tedavi sonlandırıldıđındaki oluşabilecek etkiler

BROMEKSİN Tablet tedavisi sonlandırıldıđında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, **BROMEKSİN Tablet'in** içeriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Ařađıdakilerden biri olursa, BROMEKSİN Tablet'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüleri, yüz, dudaklar, ađız, dil ve bođazda şiřme ve şiřmeye bađlı yutma veya nefes alma güçlüđu.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin **BROMEKSİN Tablet'e** karřı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir

Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı, ishal, hazımsızlık, şiřkinlik, kabızlık, bař ağrısı, bař dönmesi, terleme

Bunlar **BROMEKSİN Tablet'in** hafif yan etkileridir.

Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BROMEKSİN Tablet'in saklanması

BROMEKSİN Tablet'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklıđında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra **BROMEKSİN Tablet'i** kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz **BROMEKSİN Tablet**'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ORO İlaçları Ltd. Şti.
Mimar Sinan Mahallesi.Yedpa Ticaret Merkezi. H-2 Cadde.No: 72-73
Ataşehir /İSTANBUL
Tel: 0216 661 37 38 Fax: 0216 661 37 40
E-mail:info@oroilacлари.com

Üretici:

Medifarma İlaç San. Ltd.Şti.
Koşuyolu Caddesi, İbrahim Ağa Zaviyesi Sokak, No: 55/4
Kadıköy / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.