

KULLANMA TALİMATI

CİBACEN 10 mg film kaplı tablet

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir film kaplı tablet 10 mg benazepril hidroklorür içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Silikon dioksit, mikrokristalin selüloz, hidrojenize kastor yağı, polivinilpoliprolidon, prejelatinize mısır nişastası, laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir), mikronize polietilen glikol (PEG 8000), hidroksipropilmetilselüloz, talk, titanyum dioksit, sarı demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***CİBACEN nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***CİBACEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***CİBACEN nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***CİBACEN'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. CİBACEN nedir ve ne için kullanılır?

CİBACEN, alüminyum blister ambalajda 28 film kaplı tablet içeren bir üründür.

CİBACEN, etkin madde olarak benazepril hidroklorür içerir.

CİBACEN içeriğindeki laktoz monohidrat, hayvansal kaynaklı sığır sütünden elde edilmiştir.

Benazepril, anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü adı verilen bir ajandır.

CİBACEN, yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.

2. CİBACEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

CİBACEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Benazeprile veya CİBACEN'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
- Başka bir ADE inhibitörüne veya diğer sülfonamid türevlerine karşı alerjiniz varsa.
- Daha önce bir ADE inhibitörü ile tedavi sonucu ses kısılması, yüz, ağız, ellerde veya ayaklarda şişme ya da ani solunum problemleri olduysa.
- Hamileyseniz.
- Şeker hastalığınız veya böbrek yetmezliğiniz varsa ve aliskiren içeren bir kan basıncını düşüren ilaçla tedavi oluyorsanız.
- Sakubitril/valsartan içeren bir ilaç kullanıyorsanız. CİBACEN tedavisinin son dozunu aldıktan sonraki 36 saat içerisinde sakubitril/valsartan'a başlanmamalıdır. Eğer sakubitril/valsartan tedavisi durdurulursa, sakubitril/valsartan'ın son dozunu aldıktan sonraki 36 saat içerisinde CİBACEN tedavisine başlanmamalıdır.

CİBACEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

- Yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan aşağıdaki ilaçların herhangi birini alıyorsanız:
 - Bir anjyotensin II reseptör blokeri (ARB) (sartanlar olarak da bilinir – örneğin, valsartan, telmisartan, irbesartan), özellikle şeker hastalığına bağlı böbrek sorunlarınız varsa
 - Aliskiren
- Uzun süredir idrar söktürücü (diüretik) ilaç alıyorsanız
- Emziriyorsanız
- Lupus eritematozus, romatoid artrit veya sistemik skleroz gibi kollajen damar hastalığınız (bağ dokusu hastalığı) varsa
- Himenoptera venom (böcek sokması alerjisini test etmek veya tedavi etmek için kullanılır) tedavisi almak üzereyseniz
- Tuz kısıtlayıcı diyet yapıyorsanız
- Diyalize giriyorsanız veya girecekseniz
- Uzun süreli ishaliniz veya kusmanız varsa
- Başka kan basıncı düşürücü ilaç alıyorsanız

- Kalp kapaklarında sorunuz (aort ve mitral kapaklarında darlık) varsa
- Bir veya her iki böbrek atar damarınızda darlık varsa
- Kan damarlarınızda herhangi bir bağ dokusu hastalığınızın olduğu söylenmişse
- Kemik iliği veya kan sayımıyla ilgili bir sorunuz varsa
- Karaciğer rahatsızlığınız veya karaciğer enzimlerinde yükselmeler varsa
- Kanda potasyum, sodyum, kalsiyum düzeylerinizde yükselme veya düşme varsa
- Şeker hastası iseniz
- Gut hastalığınız (damla hastalığınız) varsa
- Kuru inatçı öksürüğünüz varsa
- Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksınız (diş cerrahisi dahil)
- Arı sokmalarına karşı duyarısızlaştırma tedavisi olacaksınız
- Rasekadotril, rapamisinin mekanistik hedefi (mTOR) inhibitörleri (örneğin; sirolimus, everolimus, temsirolimus) ve vildagliptin ile ADE inhibitörlerinin birlikte kullanımı anjiyoödem riskini arttırabilir. Bu nedenle, CİBACEN kullanıyorsanız doktorunuz rasekadotril, mTOR inhibitörleri (örneğin; sirolimus, everolimus, temsirolimus) ve vildagliptin ile tedaviye başlanmadan önce dikkatli bir fayda-risk değerlendirme yapmalıdır.
- CİBACEN ile tedavi sırasında, böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa ve/veya potasyum takviyesi (tuz ikameleri dahil), potasyum tutucu diüretikler, trimetoprim veya trimetoprim/sulfametoksazol olarak da bilinen ko-trimoksazol ve özellikle aldosteron antagonistleri ve anjiotensin reseptör blokerleri alıyorsanız kandaki potasyum seviyeniz yükselebilir. Bu sebeple doktorunuz kanınızdaki potasyum seviyesini ve böbrek fonksiyonlarınızı takip edebilir.
- Siklosporin veya heparin ile ADE inhibitörlerinin birlikte kullanımı sırasında hiperkalemi (kanda potasyum seviyesinin normalden daha yüksek olması) oluşabilmektedir. Doktorunuz kanınızdaki potasyum seviyesini takip edebilir.
- Tedaviye başlamadan önce su kaybınız, kan hacminizdeki azalma (hipovolemi) ve/veya tuz eksikliği durumunuz düzeltilmelidir.
- Tedavi sırasında kan basıncınızda aşırı düşme meydana gelirse (hipotansiyon), sırtüstü ve ayaklar zeminden yukarda olacak şekilde yatar duruma geçiniz. Gerekirse başka tedbirlerle birlikte eksilen sıvı ihtiyacınızın yerine konması gerekir. Kan basıncı ve hacmi normale döndükten sonra, CİBACEN tedavisine devam edebilirsiniz.
- Ağır kalp yetmezliğiniz varsa, kan basıncında düşme daha da belirginleşebilir ve böbrek fonksiyonlarınız azalabilir, CİBACEN ile tedavi sırasında bu yönden dikkatli takip edilmeniz gerekebilir.

- B breklerinizi alıřmasıyla ilgili bir sorununuz varsa, tedavinin ilk haftalarında b brek fonksiyonunuzun izlenmesi gerekir.
- Siyahi k kenliyseniz; y z veya boėazda řiřkinliėe neden olan ciddi alerjik reaksiyon gibi yan etkilere maruz kalma olasılıėınız daha y ksek olabilir.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir d nemde dahi olsa sizin iin geerliyse l tfen doktorunuza danıřın.

CİBACEN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

CİBACEN kullanırken alkoll  iecekler almayınız. Alkol kan basıncını daha fazla d řurebilir ve/veya bař d nmesi ya da bayılma ihtimalini artırabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan  nce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

Hamile kalmayı planlıyorsanız CİBACEN kullanmayınız. Tedavi sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz CİBACEN tedavisini derhal kesiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan  nce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

Emziriyorsanız CİBACEN'i kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

CİBACEN ile tedavi sırasında ara veya makine kullanırken tedbirli olmalısınız.  zellikle tedavinizin bařlarında kan basıncı d řmelerine daha duyarlı olabilirsiniz ve bu durum ara ya da makine kullanmanızı g leřtirebilir. Eėer bař d nmesi veya kendinizi uykulu hissederseniz, bu etkiler geinceye kadar ara ve makine kullanmayınız.

CİBACEN'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında  nemli bilgiler

Bu  r n, laktoz monohidrat iermektedir. Eėer daha  nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıėınız olduėu s ylenmiřse bu tıbbi  r n  almadan  nce doktorunuzla temasa geiniz.

İerdiėi hidrojenize kastor yaėı mide bulantısı ve ishale neden olabilir.

Diėer ilalar ile birlikte kullanımı

CİBACEN ařaėıdaki ilalarla kullanılmamalıdır.

- Aliskiren (řeker hastalıėınız veya b brek yetmezliėiniz varsa)
- Sakubitril/valsartan (kalp yetmezliėi tedavisinde kullanılır)

CİBACEN ařaėıdaki ilalarla dikkatli kullanılmalıdır.

- Vücutta potasyum tutan idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar (spironolakton, triamteren, amilorid, trimetoprim, sülfametoksazol)
- Potasyum takviyeleri veya potasyum içeren tuz ikameleri
- Lityum (mani veya depresyon tedavisinde kullanılır)
- Yüksek kan basıncını (hipertansiyon) düşüren ilaçlar (nitratlar, diüretikler, ADE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokörleri, metildopa vb)
- İnsülin veya ağız yolundan kullanılan kan şekerini düşürücü ilaçlar (oral antidiyabetikler)
- Ağrı kesici ve steroid olmayan inflamasyon ilaçları (ağrı ve inflamasyona karşı kullanılan ilaçlar; ibuprofen, indometazin, asetilsalisilik asit vb)
- Altın tedavisi (sodyum aurotiyomalat) (romatoid artrit gibi eklem hastalıklarında kullanılır)
- Rasekadotril (akut diyarenin semptomatik tedavisinde kullanılır), mTOR inhibitörleri (sirolimus, everolimus gibi vücudunuzun nakledilen bir organı reddetmesini engellemeye yardımcı olmak için kullanılan ilaç ve temsirolimus gibi berrak hücreli tip böbrek kansinomu tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve vildagliptin
- Siklosporin (vücudunuzun nakledilen bir organı reddetmesini engellemeye yardımcı olmak için kullanılan immünosupressif (bağışıklık sistemini baskılayıcı) bir ilaç)
- Heparin (kanın damar içinde pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CİBACEN nasıl kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

CİBACEN tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Almanız gereken” CİBACEN dozunu ve tedavinin süresini doktorunuz size belirtecektir. CİBACEN tek başına veya diğer kan basıncı düşürücü ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Benazeprilin ani kesilmesinin kan basıncında ani yükselmelere neden olması beklenmez.

Yüksek kan basıncı tedavisi için:

Önerilen günlük dozu 2,5 – 20 mg’ dır.

Diüretik almayan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde 10 mg’ dır (1 tablet). Dozaj kan basıncı cevabına göre, genellikle 1-2 hafta aralıklarla ayarlanır ve günde 20 mg’ a (2 tablet) çıkılabilir. Bazı hastalarda doz aralığının sonuna doğru kan basıncı düşürücü etkide azalma olabilir. Böyle hastalarda toplam günlük doz sabah ve akşam olmak üzere iki eşit doza bölünür.

İzin verilen maksimum günlük doz, 40 mg’ dır (4 tablet) (tek doz veya 2 doz şeklinde).

Yüksek kan basıncı ve böbrek fonksiyonu azalmış olan hastalar:

Doktorunuz belli durumlarda (kreatinin klerensi 30 ml/dk'nın altında) dozunuzu azaltabilir. Başlangıç dozu 5 mg'dır (yarım tablet). Dozaj günde 10 mg'a (1 tablet) artırılabilir.

Kalp yetmezliği tedavisi için:

Başlangıç dozu günde bir 2,5 mg'dır (bir tabletin dörtte biri). Kan basıncında önemli bir düşme riski nedeniyle, ilk defa CİBACEN alıyorsanız ilk dozdan sonra kan basıncında ani düşmeye bağlı olarak baş dönmesi benzeri belirtiler yaşarsanız gözlem altında tutulmanız gerekebilir. Kalp yetmezliği belirtilerinde yeterli bir iyileşme görülmeyen hastalarda, istenmeyen yan etkiler görülmediği takdirde, 2-4 hafta sonra CİBACEN'in dozu 5 mg'a (yarım tablet) yükseltilebilir. Rahatsızlığınızın ilaca verdiği cevaba göre, uygun aralıklarla, ilacın dozunu günde bir defa 10 mg'a (1 tablet) veya günde bir defa 20 mg'a (2 tablet) yükseltmeniz söylenebilir.

Genellikle günde bir defa alınan dozlar etkilidir. Bazı hastalar, sabah ve akşam günde iki doz uygulanmasına daha iyi cevap verebilirler.

Yüksek kan basıncı ve kalp yetmezliği olan hastalar:

Düşük başlangıç dozu 5 mg (yarım tablet) önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:

CİBACEN, ağız yolundan kullanım içindir, yemeklerden önce, yemek sırasında veya sonrasında bir miktar su ile alınız, tabletleri çiğnemeyiniz.

Eğer mide rahatsızlığınız varsa, özellikle bulantı, kusma veya ishal şiddetliyse ya da geçmiyorsa hemen doktorunuza danışın. Bu rahatsızlıklar çok fazla su kaybetmenize neden olabilir ve düşük kan basıncına yol açabilir. Ayrıca egzersiz yaparken veya sıcak havalarda baş dönmesi veya bayılma da meydana gelebilir. Aşırı terleme size çok fazla su kaybettirir ve düşük kan basıncına neden olur. Egzersiz ya da sıcak havalarda dikkatli olun.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CİBACEN'in çocuklarda güvenliliği ve etkililiği tespit edilmemiştir. Bu nedenle kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Hipertansiyondaki başlangıç dozu genellikle günde tek doz olarak 5 mg olup, doktorunuzun gerekli görmesi halinde 10 mg'a kadar artırılabilir.

Özel kullanım durumları

İdrar Söktürücü kullanıyorsanız:

CİBACEN tedavisine başlanmadan 2-3 gün önce idrar söktürücü ilacı kesmelisiniz. Eğer kan basıncı CİBACEN ile yeterince kontrol altına alınamaz ise tedavinize daha sonra idrar söktürücü eklenebilir.

Böbrek yetmezliđi:

Böbrek fonksiyonlarınız deđerlendirildikten sonra yetmezliđin ađırlıđına göre tedavinizin ayarlanması gerekebilir. Hafif ve orta derece yetmezlik durumunuz var ise normal dozlarda tedaviye devam belirtilecektir. Eđer Őiddetli böbrek yetmezliđiniz var ise doktorunuz günde 1/2 tablet CİBACEN gibi düşük dozla bařlamanızı söyleyecektir.

Karaciđer yetmezliđi:

Karaciđer sirozunda CİBACEN'in vücuttaki durumu deđiřmemektedir. Doz ayarlanmasına gerek olmayacaktır.

Eđer CİBACEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CİBACEN kullandıysanız:

CİBACEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.

Eđer gerekenden daha fazla CİBACEN kullandıysanız, ilacın istenmeyen etkileri ve Őiddeti artabilir. Ařırı doz alımında en çok karřılařılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (bař dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacaklarınızı yukarı kaldırınız.

CİBACEN'i kullanmayı unutursanız:

Eđer CİBACEN almayı unutursanız, unuttuđunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız. Unuttuđunuzu farkettiđinizde, sonraki doz saatine yaklařtıysanız, o zaman unuttuđunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CİBACEN ile tedavi sonlandırıldıđında oluřabilecek etkiler:

CİBACEN'i doktorunuz söylemediđi sürece kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CİBACEN'in içeriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkileri olabilir.

Yan etkiler ařađıdaki kategorilerde gösterildiđi Őekilde sıralanmıřtır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastadan birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, CİBACEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüzünüzde, dudaklarınızda, boğazınızda yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak derecede şişme bununla birlikte şiddetli kaşıntı ve kızarıklık,
- Döküntü, ağızda ülser, mevcut deri hastalıklarının kötüleşmesi, kızarma, kabarma, ve deride içi sıvı dolu kesecikleri kapsayan şiddetli ciddi deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu, pemfigus)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CİBACEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın

- Öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş gibi solunum şikayetleri

Seyrek

- Kalp rahatsızlıkları (kalp atış hızının artması, düzensiz ya da şiddetli kalp atışı, göğüs ağrısı, kalp krizi)
- Hepatit ve sarılık (karaciğer safra yollarında tıkanmayla halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, karının sağ üst tarafında ağrı, derinin ve gözakının sararması ve idrarın koyulaşması gibi belirtilerle seyreder)

Çok seyrek

- Pankreas iltihaplanması (karın üst bölümünde, özellikle sırtta ve kuşak tarzında bele yayılan şiddetli ağrı ile birlikte, bulantı, kusma ve ateş ile seyreder)
- Kolay morarma ve normalden fazla kanama, normalden çabuk enfeksiyon kapma, boğazda iltihaplanma, ateş, yorgunluk, bitkinlik, sersemlik hissi varsa ya da deriniz solgunsa, bu belirtiler kemik iliği ve kanla ilgili problemlerin birer göstergesi olabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın

- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Çarpıntı

- Yüzde kızarma
- Ciltte döküntü, kaşıntı
- Cildin ışığa hassasiyeti
- Sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı
- Yorgunluk

Seyrek

- Uyku sorunları
- Depresyon, normalden daha fazla sinirlilik ya da iç gerginliği
- Denge bozuklukları (vertigo)
- Uyuşma, karıncalanma veya hissizlik gibi normal olmayan deri hassasiyeti
- Aniden ayağa kalkarken baş dönmesi
- Göğüs ağrısı
- Öksürük
- Boğaz ağrısı
- Nefes darlığı
- Bulantı ve kusma
- İshal veya kabızlık
- Karın ağrısı
- Ateş basması
- Eklem ağrısı ve eklemlerde şişlik
- Kas ağrısı
- Sırt ağrısı ve sırtta baskı artışı
- Cildin sararması
- Göz beyazının sararması
- Kan üre azotunda ve kreatinin değerlerinde artış

Çok seyrek

- Tat alma bozukluğu
- Kulak çınlaması

Bilinmiyor

- Kanda potasyum yüksekliği

Bunlar CİBACEN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CİBACEN’in Saklanması

CİBACEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız ve nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CİBACEN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığında belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: Meda Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı .../.../..... tarihinde onaylanmıştır.