

KULLANMA TALİMATI

MERESA enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Kas içine uygulanır.

- **Etkin Madde:** Her 3 ml'lik ampulde 100 mg sülpirid içerir.
- **Yardımcı Maddeler:** Sodyum klorür, sülfirik asit (% 95), enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MERESA nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MERESA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MERESA nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MERESA'nın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MERESA nedir ve ne için kullanılır?

MERESA, negatif (Disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda kullanılır.

2. MERESA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MERESA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- Sülpirid ve içeriğinin temel maddesi olan benzamid türevlerine veya MERESA'nın diğer bileşenlerine karşı hassasiyeti olan hastalarda,
- Alkol, uyku ilacı, ağrı kesici (Opiyat) veya ruhsal durumu etkileyen (psikotrop) ilaç akut zehirlenmelerinde,
- Duygu durumunun yüksek olduğu, aşırı heyecanlı veya saldırganlığın ön planda olduğu tipteki algı, düşünce ve davranış bozukluğunun eşlik ettiği ruhsal hastalıklarda (Maniform psikoz),
- Yaşlılarda aşırı uyarılabilirliğe eşlik eden beynin fiziksel hastalıklarında (Organik psikosendrom),
- Titreme ile kendini gösteren hareket hastalığında (Parkinson) ve bu hastalık için Levodopa denilen ilacın kullanılmasında (Bkz. Bölüm "Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı"),
- Kasılma nöbetlerinde (Epilepsi),
- Kanda prolaktin hormonunun arttığı durumlarda,
- Feokromasitoma gibi böbreküstü bezinin tümörlerinde,
- Meme tümörü gibi prolaktin hormonuna bağlı tümörlerde,
- 6 yaş altı çocuklarda,
- Gebelik ve süt verme dönemlerinde,
- Akut porfiri denilen belirli bir nadir kan hastalığında,
- Koma hali veya merkezi sinir sisteminin baskılandığı durumlarda,
- Kemik iliğinin baskılanmış olduğu hallerde,
- Parkinson hastalığında

MERESA'yı kullanmayınız.

MERESA'yı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Adet dūzeni bozukluđu olan gen kadınlarda,
- ok dūřuk veya ok yūksək kan basıncı olan hastalarda,
- Damar hastalıklarında, ۆzellikle kalbi besleyen damar (Koroner damar) hastalıđı ve kalp rahatsızlıđı geirmişlerde (Kalp yetmezliđi),
- Kanın damar iinde pıhtılařmasına (Tromboz) yatkınlıđı ya da bu yūzden damar tıkanıklıđı olanlarda,
- Ciddi karaciđer veya bۆbrek rahatsızlıklarında,
- Sara hastalıđı ve benzeri kasılma nۆbetlerinde,
- Daha ۆnce, ruhsal hastalıklarda kullanılan ilalara bađlı olarak geliřmiř, yūksək ateřli, hayati tehlike arz eden, malign nۆroleptik sendrom adı verilen bir durumu (kasılmadan kendinden gemeye kadar ađır belirtiler gۆsteren bir hastalık) geirmiş olan kiřilerde,
- Sinirliliđin ve uyarılabilirliđin bulunduđu, duygu durumunun yūksək olduđu, ařırı heyecanlı veya saldırganlıđın ۆn planda olduđu tipteki algı, dūřünce ve davranıř bozukluđunun eřlik ettiđi ruhsal hastalıklarda, hastada mani veya hipomani adı verilen durumların varlıđında,
- Sūlpirid doza bađımlı olarak kalp atımının sūresinde uzamaya neden olabileceđinden varolan kalp ileti rahatsızlıklarında, kalbin yavař atması, kanda potasyum dūřüklüđu ve dođumsal veya edinilmiş QT uzaması, ađır kalp karıncıđı ritm bozukluđu riskinin arttıđı durumlarda (Torsade de pointes gibi),
- Gۆz basıncı yūksekliđi (Glokom), mide ıkıřı daralması, prostatın būyümesi ile birlikte idrar yapma gūlüđu gibi rahatsızlıklarda,
- İnme riski bulunuyorsa,
- Bunama (Alzheimer hastalıđı) olan yařlı hastalarda,
- Toplardamar tıkanıklıđı (Venۆz tromboembolizm)

Manasız tekrarlayıcı hareketleri (İmpulsif davranıřlar) olan, huzursuz (Ajite) veya saldırgan hastalarda sūlpirid sakinleřtirici (Sedatif) bir ila ile birlikte verilebilir.

MERESA'yı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ayrıca;

- Benzer maddelerle (Atipik antipsikotik) tedavi edilen hastalarda, yüksek kan şekeri düzeyleri rapor edildiğinden, diyabet veya diyabet riski olan kişilerde kan şekeri seviyesi kontrol altında tutulmalıdır.
- Yüksek dozlarda ışığa karşı hassasiyet oluşabileceğinden direkt gün ışığına maruziyetten kaçınılması önerilir.
- 6 yaş ve üstü çocuklar ile gençlerin şizofreni tedavisinde MERESA'nın kullanılmasına, sağlanacak risk – yarar oranının hekim tarafından ayrıntılı biçimde değerlendirilmesinden sonra başlanmalıdır.
- Sülpirid, hareket rahatsızlıkları (Ekstrapiramidal bozukluk) olan hastalarda, bu türdeki belirtileri arttırabileceğinden dikkatle kullanılmalıdır. Başka benzer ilaçların beraberinde kullanıldığı hastalar, hareket ile ilgili (Parkinsonizm) ve zihinsel durumdaki bozulmalara karşı dikkatle izlenmelidir.
- Yaşlı hastalar hareket etmeye veya duruşa bağlı kan basıncında düşme veya uyuşukluğa bağlı olarak düşmelere daha fazla yatkın olacağından sülpirid verirken dikkatli olunmalı ve dozaj azaltılmalıdır.
- Antipsikotik ilaçların ani kesilmelerinden sonra, bulantı, kusma, terleme, uykusuzluk gibi ani çekilme belirtileri görülmüştür. Hastalık belirtileri tekrarlayabilir ve istemsiz hareket bozuklukları (Akatizi, distoni ve diskinezi gibi) rapor edilmiştir. Bu yüzden ilacın azaltılarak bırakılması tavsiye edilir.

MERESA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

MERESA tedavisi sırasında, alkol dolayısıyla MERESA'nın kandaki düzeyleri öngörülemez şekilde değişebileceğinden veya güçlenebileceğinden, alkol kullanımından kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MERESA için insanlar üzerinde deneyim bulunmadığından ve ilaca ait hayvan deneyleri yetersiz olduğundan ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

Gebeliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yenidoğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri (Ekstrapiramidal işaretler/ekstrapiramidal semptomlar) ve/veya ilaç kesilme semptomları açısından risk altındadırlar. Bu semptomlar; huzursuzluk (Ajitasyon), kasların aşırı gerginliği (Hipertoni), kasların gerginliğini yitirmesi (hipotoni), titreme (tremor), uyku hali (Somnolans), solunum zorlanması (Respiratuar distres) veya beslenme bozukluklarını içermektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MERESA, anne sütüne geçtiği ve bebekte istenmeyen etkiler bırakabileceği için, emzirme döneminde kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MERESA'nın araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkisi olduğu görülmüştür. Bu etki alkol ile birlikte artmaktadır. Bu nedenle MERESA tedavisi sırasında araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

MERESA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MERESA her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

MERESA'nın merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçların (Hipnotik, sedatif, trankilizanlar) yatıştırıcı etkisini artırır (Örneğin ruhsal, zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, uyku ilacı, merkezi sinir sistemini etkileyen ağrı kesiciler, narkoz ilaçları, alerji, soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar).

MERESA'nın merkezi sinir sisteminde uyarıcı etki yapan (İştah açılması için kullanılan ilaçlar, astım ilacı) ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda uykusuzluk, ileri derecede rahatsızlık, sinirlilik, korku ve aşırı uyarılabilirlik etkileri oluşabilir.

MERESA kan basıncını düşüren ilaçların etkisini azaltabilir veya kan basıncı yükselmesi krizine sokabilir.

Kalp uyarı ileti sistemi üzerine etki eden ilaçlarla ağır kalp ritmi sorunlarına (Torsades de pointes) yol açabileceğinden birlikte kullanılması önerilmez:

- Beta blokerler, belirli kalsiyum kanal blokerleri (Diltiazem ve verapamil) klonidin, guanfasin, dijital glikozitler gibi kalp ritmini düşüren ilaçlar,
- idrar söktürücüler, müshiller, amfoterisin B içeren antibiyotiğin damar içine uygulanması,
- Şeker metabolizmasını etkileyen böbreküstü bezi hormonları ve türevleri (glukokortikoidler, tetrakozaktidler) gibi kan potasyumunu düşüren ilaçlar (Kan potasyumu düşükse tedavi edilmelidir.),
- Kalp ritm bozukluğu tedavisinde kullanılan belirli [Sınıf Ia (Kinidin, disopramid) ve sınıf III (Amiadaron, sotalol) antiaritmik] ilaçlar,
- Pimozid, sultoprid, haloperidol, trisiklik antidepresanlar (Örn imipramin), lityum, bepridil, sisaprid, tiyoridazin, intravenöz vinkamin, halofantrin, pentamidin veya sparfloksasin içeren ilaçlar,
- Metadon (Madde bağımlılığında kullanılan ilaç),
- Damar içine verilen eritromisin antibiyotiği (İntravenöz eritromisin).

Birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar

- Levodopa (Parkinsonda kullanılan bir ilaç):

Levodopa ile birlikte kullanıldığında birbirlerinin etkilerini azaltır.

Birlikte kullanıldığında dikkatli olmayı gerektiren ilaçlar

- Antihipertansif ilaçlar (Bütün türler)

Ortostatik hipotansiyon riskinde ve tansiyonu düşürme etkisinde artış (Antihipertansif etki).

- Diğer merkezi sinir sistemi (MSS) depresanları; ağrı kesici, sakinleştirici, kaygı-endişe giderici ilaçlar

Narkotikler, analjezikler, barbitüratlar; benzodiazepinler; ve diğer anksiyolitikler, sedatif H₁ antihistaminikleri, klonidin ve derivatları.

- Mide koruyucu ilaçlar (Antiasidler ve sukralfat)

Aluminyum içeren ve mide koruyucu ilaçlar (Antiasitler veya sulfraktatlar) ile beraber kullanılması MERESA'nın emilimini azaltır. Bu sebeple MERESA bu ilaçlar kullanılmadan en az 2 saat önce alınmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MERESA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Dozaj, hastanın bireysel etki durumu, yaş ve kilosuna göre ve ayrıca hastalığının türü ve safhasına göre belirlenir.

MERESA'yı mutlaka doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MERESA ampulu doktorunuz ya da diğer sağlık personeli size gerektiği şekilde uygulayacaktır.

Doktor tarafından düzenlenmediyse MERESA aşağıdaki gibi kullanılmalıdır:

Şizofreni tedavisi:

Kural olarak yetişkinlerde günlük 2 – 10 ampul MERESA (200 ila 1000 mg sülpirid) 2 ila 4 defalık doza bölünerek kas içine enjekte edilir.

Şizofreni tedavisinde 1600 mg sülpirid / gün maksimum dozu yalnızca psikiyatr onayı doğrultusunda verilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

MERESA'yı mutlaka doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MERESA ampulu doktorunuz ya da diğer sağlık personeli size gerektiği şekilde uygulayacaktır.

Akut ve kronik hastalık tablolarında; başlangıç tedavi dozu 2 ila 10 ampul MERESA, 100 mg / 3 ml (200 – 1000 mg sülpirid / gün) kas içine 2 ila 9 gün uygulanır. Günlük doz miktarı 10 Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul'ü geçmemelidir (1000 mg sülpirid).

Başlangıç dozunun ardından; hastalığın niteliğine göre ağızdan tedavi ile devam edilebilir.

Kas içine enjeksiyon, büyük kaslardan birine derin ve yavaş olarak uygulanır [Pıhtı çözücü (Trombolitik) tedavi alan kişilerde dikkat edilmelidir].

Enjeksiyon başına kas içine 2 ampulden daha fazla uygulanmamalıdır.

Klinik tecrübe eksikliğinden dolayı damar içine uygulama tavsiye edilmemektedir.

Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul'ün kronik kullanılışı; akut kullanımına göre daha azdır.

Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 2 ila 9 gün arasında uygulanmaktadır.

Merkezi sinir sistemi üzerine etkileri nedeniyle MERESA'nın son dozunun uyku bozukluklarına sebep olmaması amacıyla saat 16.00'dan önce uygulanması önerilmektedir.

Düzenli olarak kan tablosunun, böbrek işlevlerinin ve kalp damar sistemin kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım

Altı yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

6 yaş üstü çocuklarda ve gençlerde sadece uzman doktorun risk değerlendirmesi ile MERESA ile tedavi gerçekleştirilebilir.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlı hastalar, yukarıda belirtilen yetişkin dozunun yarısını almalıdırlar.

Özel kullanım durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalara, bozukluğun seviyesine göre, düşük günlük dozlar verilir. Alacağınız doz doktorunuz tarafından belirlenir.

Eğer MERESA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MERESA kullandıysanız:

MERESA'dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı durumunda doktora başvurulmalıdır. Doz aşımı ve zehirlenme durumu değerlendirilirken; intihar amaçlı çeşitli ilaçların alınması gibi olası çapraz zehirlenme ihtimali göz önüne alınmalıdır.

Hafif doz aşımının belirtileri örnek olarak huzursuzluk, bilinç bulanıklığı ve hareket kabiliyetinde bozukluklar (Ekstrapiramidal motor bozukluklar) olabilir. Aşırı heyecan, karışıklık duygusu ve ağır hareket bozuklukları (Ekstrapiramidal motor bozukluklar) şiddetli bir zehirlenmede ortaya çıkabilir. Bu türden hastalık belirtileri ortaya çıktığı takdirde, derhal, yoğun bakım ve benzeri gerekli önlemleri alabilecek bir doktor bilgilendirilmelidir.

MERESA'yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MERESA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedaviye ara vermek istiyorsanız, bunu öncelikle doktorunuz ile görüşmelisiniz. İlaç tedavisini kendi inisiyatifinizle, doktorunuza danışmadan kesmeyiniz. Bu şekilde tedavi başarısını tehlikeye atabilirsiniz.

İlacın uygulanması ile ilgili başka sorularınız var ise, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Antipsikotik ilaçların ani kesilmelerinden sonra, bulantı, kusma, terleme, uykusuzluk gibi ani çekilme belirtileri görülmüştür. Hastalık belirtileri tekrarlayabilir ve istemsiz hareket bozuklukları (Akatizi, distoni ve diskinezi gibi) rapor edilmiştir. Bu yüzden ilacın azaltılarak bırakılması tavsiye edilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MERESA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MERESA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ani gelişen ve hızlı ilerleyen, şiddetli alerji belirtileri: kaşıntı, kabarma, kızarıklık, şiddetli solunum güçlüğü, yüz, dil, dudaklar ve boğazda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MERESA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kol bacaklarda veya yüzde, boyunda şiddetli titreme, katılma - kasılma ya da hareketlerinde ciddi bozukluk
- Ciddi çarpıntı, kalp atım ritminin aşırı artması
- Kalp ritminde çok fazla düşme, kalp atım aralığının aşırı uzaması ya da düzensiz olması
- Kan basıncında çok fazla düşme veya özellikle tansiyon yüksekliği olanlarda kan basıncında artma
- Yüksek ateş, kas katılığı, zihin bulanıklığı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın :

- Kalp atımının hızlanması

- Memelerde büyüme, ağrı, gerginlik hissi, süt gelmesi; kadınlarda adet değişiklikleri; erkeklerde memelerin büyümesi, cinsel istek ve güçte azalma
- Bulantı, kusma, kabızlık, ağız kuruluğu veya artmış tükürük salgısı, aşırı terleme, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, bitkinlik, azalmış fiziksel faaliyet

Yaygın Olmayan :

- Kol bacaklarda veya yüzde, boyunda şiddetli titreme, katılma - kasılma ya da hareketlerinde ciddi bozukluk
- İdrar yapmada değişiklik
- Kilo alımı ve/veya iştah artışı

Seyrek :

- Kan basıncında çok fazla düşme veya özellikle tansiyon yüksekliği olanlarda kan basıncında artma, ayağa kalkmak ile kan basıncının ani düşmesi
- Kaşıntı, deri döküntüsü, deride renk değişiklikleri, ışığa duyarlılık
- Görmede bozukluk
- Sinirlilik, saldırganlık, huzursuzluk, uyku bozukluğu, dikkat bozukluğu
- Özellikle oturma – kalkmaya bağlı ani kan basıncı değişiklikleri
- Kol – bacaklarda, göz kaslarında, yüzde, çene, dil, boyun ve sırt kaslarında titreme, kasılma ve diğer benzeri hareket bozuklukları, huzursuzluk hissi, oturamama halinin eşlik ettiği rahatsızlık

Çok seyrek:

- Ani gelişen ve hızlı ilerleyen, şiddetli alerji belirtileri: kaşıntı, kabarma, kızarıklık, şiddetli solunum güçlüğü, yüz, dil, dudaklar ve boğazda şişme
- EKG değişiklikleri, kalp ritminde çok fazla artma, kalp atım aralığının aşırı uzaması ya da düzensiz olması, ani kalp durması ve ani ölüm
- Yüksek ateş, kas katılığı, zihin bulanıklığı
- Sarılık

Sıklığı bilinmiyor :

- Burun akıntısı veya burunda dolgunluk
- Toplardamar tıkanıklığı (Derin ven trombozu çoğu kez bacadaki toplardamarlarda)

pıhtı oluşmasıdır. Oluşan pıhtının bacak toplar damarlarını tıkanması sonucu bacakta şişlik, ağrı ve yürüyememe şikayeti oluşurken, pıhtının bulunduğu yerden kopup akciğere gitmesi ile akciğer embolisi olarak isimlendirilen nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı ile karakterize ve bazen ölümcül olabilen bir durum gerçekleşir)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MERESA'nın saklanması

MERESA'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MERESA'yı kullanmayınız. Eğer üründe ve/ veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MERESA'yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Dolorgiet Arzneimittel

53754 St. Augustin/ Bonn ALMANYA lisansı ile;
ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No: 88
55020 - SAMSUN

Üretim yeri: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No.88
55020 – SAMSUN

Bu kullanma talimatı en son 'de onaylanmıştır.