

KULLANMA TALİMATI

CANOLEN %1 VAJİNAL KREM

Vajinaya sürülerek kullanılır.

- **Etkin madde:** Siklopiroksolamin 10 mg/g
- **Yardımcı maddeler:** Palmito-stearik etilen glikol ve polioksietilen glikon, PEG-6 gliseril linoleat, mineral yağ, benzoik asit, butil hidroksianisol, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimata yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
2. CANOLEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CANOLEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CANOLEN'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?

CANOLEN, 1 gramında 10 mg siklopiroksolamin etkin maddesini içerir. 30 gr krem içeren alüminyum tüpte ve 6 adet tek kullanımlık aplikatörler ile kullanıma sunulmuştur

CANOLEN, vajinanın mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

2. CANOLEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANOLEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- CANOLEN'in içindeki etkin madde olan siklopiroksolamin veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
- Emziriyorsanız
- CANOLEN göze uygulanmamalıdır.

CANOLEN'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Hamilelerde
- Yenidođan, bebek ve çocuklarda.
- Eřler birbirlerini enfekte edebilirler. Bu nedenle, tekrar yařanabilecek bir enfeksiyonun önlenmesi için hastanın eři de doktora bařvurmalıdır.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danıřın.

CANOLEN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

CANOLEN haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve iecek ile etkileřimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

CANOLEN ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüđünde hamilelik sırasında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danıřınız.

Süt verme sırasında CANOLEN sadece, kesinlikle gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

CANOLEN'in ieriđinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün benzoik asit içermektedir. Deriye, göze ve mukoz membranlarına hafif derecede irritan.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Bařka ilalarla karřılıklı etkileřmeye řimdiye kadar rastlanmamıřtır.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CANOLEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı için talimatları:

Birlikte verilen bir defa kullanılmaya mahsus aplikatör yardımı ile günde bir defa 5 g CANOLEN (1 aplikatör dolusu) vajinanın derinine uygulanır.

Tedavinin süresi, vajinadaki mantar enfeksiyonunun iyileřmesine bađlıdır. Genellikle üst üste

6 gün CANOLEN uygulanmasıyla iyileşme elde edilir. Ancak, doktor tetkik sonuçlarına dayanarak tedavinin en fazla 14 gün olmak üzere sürmesine karar verebilir.

Uygulama yolu ve metodu:


Uygulama sırasında sırt üstü yatmalı ve bacaklarınızı hafifçe karnınıza doğru çekmelisiniz.

Uygulama en iyi gece yatmadan önce yapılır. Her uygulama için yeni bir aplikatör kullanmalısınız.


Yeni bir enfeksiyonun önlenmesi için, anal bölgeye kadar vajinanın etrafına dıştan CANOLEN sürülmelidir. Bunun için aplikatör kullanmadan, vajinal krem bir parça pamuk üzerine sıkılıp söz konusu bölgelere sürülür.

CANOLEN vajinal kremin aplikatör yardımıyla uygulanişı

Tüpün kapağını açarak yerine aplikatörü takınız.



Tüpü dikkatlice sıkarak, aplikatör pistonunda STOP (DUR) işaretli okun ucu gözükeneye kadar aplikatörü doldurunuz.



Aplikatörü tüpten ayırıp derin olarak vajinaya yerleştiriniz.
Bunun için sırt üstü yatıp bacaklarınızı hafifçe karına doğru çekiniz
Pistonu iterek aplikatörün içindeki kremi tamamen boşaltınız.



Tek kullanımlık aplikatörü çıkartıp atınız.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

Doktorunuz zorunlu olarak kullanılmasına karar vermedikçe 6 yaşından küçük çocuklarda ve yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.

Eğer CANOLEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANOLEN kullandıysanız:

CANOLEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CANOLEN'i kullanmayı unutursanız:

Hatırladığımızda CANOLEN'i uyguluyoruz.

Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.

CANOLEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Hastalığınızın yeniden ortaya çıkmaması için doktorunuza danışmadan tedaviye son vermeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CANOLEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Seyrek: Alerjik kontakt dermatit (temas sonucu gelişen alerji)

Bilinmiyor: Kaşıntı veya yanma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkilerin bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CANOLEN’in saklanması

CANOLEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANOLEN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GLOBAL PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yukarı Dudullu Mahallesi Hünkar Sk. Azeri İş Merkezi Apt. No: 4 A/1 ÜMRANIYE/
İSTANBUL

Üretim yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic.A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:158 Sancaktepe/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 19/06/2020 tarihinde onaylanmıştır.