

## KULLANMA TALİMATI

### VELTİFER® 100 mg/5 ml Oral Solüsyon

#### Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir oral flakon (5 ml) 100 mg elementer demire eşdeğer Demir III hidroksit polimaltoz kompleksi içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sukroz, sorbitol %70 nonkristalize (E420), metil p-hidroksi benzoat (E219), propil p-hidroksi benzoat (E217), tutti frutti esansı, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz** kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **VELTİFER nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VELTİFER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VELTİFER nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VELTİFER'in saklanması**

#### **Başlıkları yer almaktadır.**

##### **1. VELTİFER nedir ve ne için kullanılır?**

VELTİFER, demir III hidroksit polimaltoz kompleksi içeren ve ağızdan kullanılan bir solüsyondur. Her bir VELTİFER oral flakonu (5 ml), 100 mg elementer demire eşdeğer demir III hidroksit polimaltoz kompleksi içerir.

VELTİFER her kutuda her biri bir içimlik (5 ml) 10 adet ya da 20 adet flakon içerir.

VELTİFER, kanda kırmızı kan hücrelerinin içindeki demirin azaldığı kansızlık durumlarında kullanılır.

VELTİFER'in yapısındaki demir, hidroksit polimaltoz molekülleri birleştirilerek kompleks bir molekül haline getirilmiştir. VELTİFER, değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliğine bağlı gelişen kansızlığın tedavisi ile hastalıktan korunmada kullanılır.

##### **2. VELTİFER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

###### **VELTİFER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Eğer sizde demir yüklenmesi (hemokromatozis, hemosideroz) varsa,

- Eđer demire ya da ierdięi yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılıęımız var ise,
- Eđer demir kullanımı bozukluęunuz (kursun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve “Akdeniz Anemisi” (talasemi) hastalıęınız var ise,
- Ciddi karacięer ve bbrek hastalıęınız varsa,
- İlerleyici ve kronik eklem iltihabınız varsa,
- Dzenli olarak devamlı kan transfzyonu gerektiren durumlarınız varsa,
- HIV infeksiyonunuz var ve demir eksiklięine baęlı aneminiz klinik olarak kesinleřtirilmemiřse,
- Eđer demir eksiklięine baęlı olmayan aneminiz (hemolitik anemi) var ise kullanmayınız.

### **VELTİFER’i ařaęıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Dzenli olarak devamlı kan transfzyonu (kan nakli) gerektiren durumlarınız varsa.
- Mide lseriniz varsa VELTİFER kullanılıp kullanılmayacaęına doktorunuz karar verecektir.
- Aęızdan alınan demir ilalarının kullanımı sırasında dıřkının rengi koyulařabilir, bu durum normal olup herhangi bir nlem gerektirmez.
- Dıřkıda gizli kan aranması sırasında yanılıęıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.
- Alkolizm ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır.
- eřitli hastalıklara veya kansere baęlı geliřen kansızlıkta, alınan demir karacięerde depolanır ve ancak hastalıkların ve kanserin tedavisini takiben karacięerden ayrılarak kullanılır hale gelir.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **VELTİFER’in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

VELTİFER yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.

Kalsiyum ieren ilalarla birlikte alınmamalıdır. Arada en az 2 saat sre bırakılmalıdır.

Benzer řekilde st ve st rnleri ile aynı anda alınmaması nerilir.

### **Hamilelik**

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

VELTİFER hamilelikte demir desteęi olarak kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

### **Emzirme**

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

VELTİFER emzirme dneminde kullanılabilir.

### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı zerinde hibir etkisi yoktur.

### **VELTİFER’in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

VELTİFER, sorbitol (E420) ve řeker iermektedir. Eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karşı dayanıksızlıęınız olduęu sylenmiřse VELTİFER’i almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

İçerdiği metil hidroksibenzoat (E219) ve propil hidroksibenzoat (E217) nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Demir III hidroksit polimaltoz kompleksi besinler ve birlikte uygulanan ilaçlarla (tetrasiklinler, antiasitler) iyonik bir etkileşim yapmaz. C vitamininin demir emilimini artırdığı bilinmektedir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. VELTİFER nasıl kullanılır?**

#### **• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

VELTİFER'i daima tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol etmelisiniz. Bu ilaç size reçete edilmiştir. Başkalarına vermeyiniz. Semptomları sizinkilerle aynı bile olsa onlara zarar verebilir.

**Gizli demir eksikliği:** Günde yarım veya 1 flakon VELTİFER (50-100 mg)

**Ciddi demir eksikliği:** Günde 2-3 defa 1 flakon VELTİFER (200-300 mg)

Tedavi süresi, kansızlığın derecesine ve kırmızı kan hücresi sayısının normalleşmesine bağlıdır. Belirgin demir eksikliğinde normal kan değerlerine ulaşmak ortalama 3-5 aylık tedavi ile olur. Gizli demir eksikliğinde tedavi süresi 1-2 aydır.

Demir depolarını doldurmak için, kan parametrelerinin (Hb, Hct, eritrosit sayısı) normale dönüşünden yaklaşık 1 ay sonrasına kadar tedavi sürdürülmelidir.

#### **• Uygulama yolu ve metodu:**

VELTİFER sadece ağızdan kullanım içindir.

#### **• Değişik yaş grupları**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

VELTİFER'in 12 yaşın altındaki çocuklarda, su anda rutin kullanım için bir dozaj rejimi tavsiye etmek için yeterli veri mevcut değildir.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yetişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.

#### **• Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/karaciğer yetmezliği:**

VELTİFER'i ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanmayınız.

*Eğer VELTİFER'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla VELTİFER kullandıysanız**

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.

VELTİFER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

#### **VELTİFER'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Unutulan dozu atlayınız ve bir sonraki dozu almanız gereken saatte alınız.

#### **VELTİFER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, VELTİFER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, VELTİFER kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde
- Şiddetli döküntü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VELTİFER'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Göğüste ya da boğazda ağrı (özellikle yutarken)
- Kanlı dışkı (kırmızı ya da siyah renk)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz**

- Mide bulantısı
- İshal
- Kusma
- Kabızlık
- Karında rahatsızlık hissi
- Midenizde yanma hissi
- Hazımsızlık
- İdrar ve dışkı renginde değişiklik
- Hafif karın ağrısı
- Baş ağrısı

Bunlar VELTİFER'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. VELTİFER’in saklanması**

VELTİFER’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra VELTİFER’i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VELTİFER’i kullanmayınız.

#### ***Ruhsat sahibi:***

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Büyükdere Cad. No: 193 Levent  
34394 Şişli-İSTANBUL  
Tel: 0212 339 10 00  
Faks: 0212 339 10 89

#### ***Üretim yeri:***

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*