

KULLANMA TALİMATI

EPLEDAY 25 mg film kaplı tablet
Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin madde:** Her bir film kaplı tablet 25 mg eplerenon içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz D.C., mikrokristalin selüloz, kroscarmelloz sodyum, sodyum lauril sülfat, talk, magnezyum stearat, Opadry II Yellow 85G32342 içeriği [Polivinil alkol, talk, titanyum dioksit (E 171), makrogol/peg, lesitin (soya) (E 322), sarı demir oksit (E 172 iii), kinolin sarısı alüminyum lak (E 104), siyah demir oksit (E 172 i)]

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **EPLEDAY nedir ve ne için kullanılır?**
2. **EPLEDAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **EPLEDAY nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **EPLEDAY'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. EPLEDAY nedir ve ne için kullanılır?

EPLEDAY, film kaplı tablettir. EPLEDAY 30, 50 ve 100 tablet içeren Alu/Alu blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Etkin maddesi eplerenondur.

EPLEDAY, kalp damar sistemine etki eden ilaçlardan aldosteron antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar vücutta üretilen ve kan basıncınızı ve kalp fonksiyonunuzu kontrol eden aldosteronun etkisini inhibe eder. Vücudunuzdaki yüksek aldosteron seviyeleri vücudunuzda kalp yetmezliğine yol açacak şekilde değişikliklere neden olabilir.

EPLEDAY, kalp yetmezliđinizi tedavi etmek amacıyla; kötüleşmesini önlemek ve bu nedenle hastaneye yatışı azaltmak için aşağıdakilerden biri sizde bulunuyorsa kullanılır:

1. Son zamanlarda kalp krizi geçirdiyse, kalp yetmezliđinizi tedavi etmek amacıyla kullanılan diđer ilaçlarla birlikte veya
2. Uzun süredir aldıđınız tedaviye rağmen sürekli, hafif belirtiler varsa

EPLEDAY ayrıca yüksek kan basıncı (hipertansiyon) olan yetişkinler tarafından da alınabilir. Kendi başına veya diđer ilaçlarla birlikte kan basıncını düşürür. Kan basıncını düşüren ilaçlar, felç veya kalp krizi riskinizi de azaltır.

2. EPLEDAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPLEDAY'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eđer;

- Eplerenon ya da EPLEDAY'ın içerdiđi herhangi bir maddeye aşırı duyarlılıđınız (alerjiniz) varsa,
- Potasyum seviyeniz yüksekse. Doktorunuz potasyum deđerinizi ölçmek için kan testi yapacaktır.
- Ciddi böbrek sorunlarınız varsa,
- Ciddi karaciđer yetmezliđiniz varsa,
- Aşağıdaki hastalıklar için belirtilen ilaçları alıyorsanız:
 - Potasyum tutucu idrar söktürücü (diüretik),
 - Potasyum takviyesi,
 - Mantar enfeksiyonları, örn. ketokonazol, itrakonazol,
 - Enfeksiyonlar, örn. klaritromisin, telitromisin,
 - Depresyon, örn. Nefazodon,
 - HIV (AIDS), örn. ritonavir, nefinavir,
 - Kalp sorunları veya hipertansiyonu tedavi eden anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü ve anjiyotensin reseptör blokleri (ARB) olarak adlandırılan ilaçların her ikisini birlikte alıyorsanız.

EPLEDAY'ı yüksek kan basıncınızı tedavi amaçlı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız.

Eđer;

- İdrarda proteinle birlikte tip 2 diyabetiniz varsa,
- Erkek hastalarda serum kreatinin deđeri >2.0 mg/dL veya kadın hastalarda >1.8 mg/dL ise,
- Kreatinin klerensi deđeriniz <50 mL/dak ise,
- Potasyum veya potasyumu artıran amilorid, spironolakton veya triamteren gibi idrar söktürücü (diüretik) ilaçları eşzamanlı olarak alıyorsanız.

EPLEDAY'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer;

- Kanda potasyum seviyenizin artma (hiperkalemi) riskiniz bulunuyorsa, Doktorunuz tedavinizin bařlangıcında ve dozda bir deęişiklik yaptıęında potasyum seviyelerinizi izleyecektir.
- Böbrek hastalığınız varsa,
- Hafif ve orta řiddette karacięer hastalığınız varsa,
- Ağrı, katılık ve iltihabı gidermek için kullanılan ilaçlar (NSAI ilaçlar) kullanıyorsanız,
- Lityum (genellikle bipolar bozukluk olarak da bilinen manik depresif bozukluk için verilir) ile aynı zamanda alıyorsunuz,
- Takrolimus veya siklosporin (psöriyazis ve egzema gibi cilt sorunlarını tedavi etmek için ve organ nakli sonrası rejeksiyonu önlemek için kullanılır) alıyorsunuz,
- EPLEDAY'in yıkılımını artırarak, böylece etkisini azaltan güçlü CYP3A4 indükleyicileri olarak adlandırılan ilaçları kullanıyorsanız,
- Kanda potasyum seviyenizin artmasına neden olan potasyum tutucu diüretik (spironolakton, amilorid, triamteren) ve potasyum desteęi alıyorsunuz.

EPLEDAY'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

EPLEDAY yemeklerden önce veya sonra kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Gebe kalırsanız hemen doktorunuza haber veriniz. EPLEDAY'in doęmamıř bebeęinize zarar verip vermeyeceęi bilinmemektedir. Ancak beklenen potansiyel yarar risklerden daha fazla ise, gebelik döneminde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. EPLEDAY anne sütü yoluyla bebeęinize geçebilir. Birok ilaç insan sütüne geçtięinden ve emzirilen bebek üzerindeki istenmeyen etkilerin bilinmeyen potansiyelinden dolayı, ilacın anne aısından önemi dikkate alınarak, emzirmeye son verilmesi veya ilacın kesilmesi konusunda doktorunuz karar verecektir.

Ara ve makine kullanımı

EPLEDAY'in ara ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkisiyle ilgili herhangi bir alıřma gerçekleştirilmemiřtir. Eplerenon uyku hali veya zihinsel fonksiyon bozukluęuna neden olmaz ancak ara veya makine kullanırken, tedavi sırasında bař dönmesi görülebileceęi dikkate alınmalıdır.

EPLEDAY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EPLEDAY her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

EPLEDAY soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

EPLEDAY laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte EPLEDAY almayınız:

- EPLEDAY'in yıkımını azaltarak vücut üzerindeki etkisini artıran itrakonazol veya ketokonazol (mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır), ritonavir, nelfinavir (HIV'yi tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaç), klaritromisin, telitromisin (bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır) veya nefodazon (depresyon tedavisi için kullanılır).
- Kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artıran potasyum tutucu diüretikler (vücudunuzdaki fazla sıvıyı atmanıza yardım eden ilaçlar) ve potasyum destekleri (takviyeleri) (sofra tuzları).
- Kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artıran anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin birlikte kullanımı (ARB) (yüksek kan basıncı, kalp hastalığı ve özel böbrek sorunlarının tedavisinde kullanılır).

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

- Lityum (genellikle bipolar bozukluk olarak da adlandırılan manik depresif bozukluk için verilir). Lityumun diüretikler ve ADE inhibitörleri (yüksek kan basıncı ve kalp hastalığı tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanımının; tat kaybı, göz bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kas seğirmesi yan etkilerine yol açabilen kanda lityum seviyelerinin çok artmasına neden olduğu görülmüştür.
- Siklosporin veya takrolimus (psöriyazis ve egzema gibi cilt sorunlarının tedavisinde ve organ nakli sonrası doku reddini önlemede kullanılır). Bu ilaçlar böbrek problemlerine neden olabilir ve bu nedenle kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artırır.
- NSAİ ilaçlar (ağrı, katılık ve iltihabı gidermek için kullanılan ibuprofen gibi belli ağrı kesiciler). Bu ilaçlar böbrek problemlerine neden olabilir ve bu nedenle kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artırır.
- Trimetoprim (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır). Bu ilaç kanınızda yüksek potasyum seviyesi riskini artırabilir.
- Prazosin, alfuzosin gibi alfa I blokerler (yüksek kan basıncının ve özel prostat problemlerinin tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar kan basıncınızda düşüşe ve ayağa kalktığınızda başınızın dönmesine neden olabilir.

- Amitriptilin veya amoksapin gibi trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisi için), klorpromazin veya haloperidol (psikiyatrik bozuklukların tedavisi için) gibi antipsikotikler (ayrıca nöroleptikler olarak bilinirler), amifostin (kanser kemoterapisi sırasında kullanılır). Bu ilaçlar kan basıncınızda düşüşe ve ayağa kalktığınızda başınızın dönmesine neden olabilir.
- Hidrokortizon veya prednizon gibi glukokortikoidler (iltihap veya belli cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır) ve tetrakosaktid (esas olarak adrenal korteks bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar EPLEDAY'in kan basıncı düşürücü etkisini azaltabilir.
- Digoksin (kalp sorunlarının tedavisinde kullanılır). EPLEDAY ile birlikte alındığında, digoksin kan seviyeleri yükselebilir.
- Varfarin (pıhtı önleyici bir ilaç). Kanda yüksek varfarin seviyeleri, EPLEDAY'in vücut üzerine olan etkisinde değişikliklere neden olabileceğinden; varfarin ile alındığında dikkatli olunmalıdır.
- Eritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), sakonavir (HIV tedavisi için antiviral ilaç), flukonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), amiodarone, diltiazem ve verapamil (kalp sorunları ve yüksek kan basıncı tedavisi için). Bu ilaçlar EPLEDAY'in yıkılımını azaltarak EPLEDAY'in vücut üzerine etkisini uzatır.
- Sarı kantaron (St. John's Wort) (bitkisel ilaç), rifampisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), karbamazepin, fenitoin, ve fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar EPLEDAY'in yıkılımını artırır ve böylece etkisini azaltır.

Doktorunuza reçetesiz ilaçlar, bitkisel veya doğal ilaçlar ve takviyeler dahil aldığınız tüm ilaçları bildirin.

Doktorunuza veya eczacınıza göstermek üzere yanınızda vitaminleri ve doğal veya bitkisel ilaçları da içeren ilaç listenizi bulundurunuz.

Yeni bir ilaç ya da doğal veya bitkisel ilaç kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EPLEDAY nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Hipertansiyon

EPLEDAY'in önerilen başlangıç dozu günde bir kez 50 mg'dır. EPLEDAY'in tam terapötik etkisi, 4 hafta içinde ortaya çıkar. Günde bir kez 50 mg'a yetersiz kan basıncı yanıtı olan

hastalarda, EPLEDAY dozajı, günde iki kez 50 mg'a artırılır. Kan basıncı üzerinde 100 mg'dan daha büyük bir etkisi olmaması ve hiperkalemide bir risk artışıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle, daha yüksek dozajlarda EPLEDAY önerilmez.

Kalp yetmezliği

EPLEDAY genellikle kalp yetmezliği için diğer tedavilerle birlikte (beta blokerler gibi) uygulanır. Tedavi günde bir kez 25 mg dozunda başlatılır ve yaklaşık 4 hafta içinde günde 50 mg'a artırılır (bir tane 50 mg tablet veya iki tane 25 mg tablet olarak). Maksimum doz günde 50 mg'dır.

EPLEDAY tedavisine başlamadan önce, ilk hafta içerisinde ve tedavi başladıktan bir ay sonra veya dozda bir değişiklik olduğunda; kan potasyum seviyeleri ölçülmelidir. Kanınızdaki potasyum seviyelerine dayanarak doz doktorunuz tarafından ayarlanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

EPLEDAY aç veya tok karnına uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Pediyatrik popülasyonda eplerenon kullanımının önerilmesi için yeterli veri yoktur; dolayısıyla bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Başlangıç dozunun ayarlanması gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif şiddette böbrek yetmezliğiniz varsa tedaviye günde 25 mg tablet ile başlanmalıdır.

Orta şiddette böbrek yetmezliğiniz varsa, gün aşırı 25 mg tablet ile tedaviye başlanmalıdır. Bu dozlar doktorunuzun tavsiyesine, kan potasyum seviyelerinize göre ayarlanabilir.

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa EPLEDAY kullanmanız önerilmemektedir.

Potasyum düzeyleri, idrarda proteinle seyreden şeker hastaları da dahil olmak üzere böbrek fonksiyonları yetersiz olan hastalarda düzenli olarak izlenmelidir. Serum kreatinin düzeyi 2.5 mg/dL'den yüksek veya kreatinin klerensi 50 mL/dak'dan düşük olan hastaların dikkatle tedavi edilmesi gerekir. Böbrek fonksiyonları azaldıkça, kan potasyum seviyesinde artış riski gözlenir. Eplerenon hemodiyalizle atılmaz.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozunun ayarlanması gerekmez.

Karaciğer veya böbrek problemlerinizi varsa kan potasyum seviyelerinizin daha sık test edilmesi gerekebilir.

Eğer EPLEDAY'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EPLEDAY kullandıysanız:

EPLEDAY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer ilacınızdan çok fazla aldıysanız; oluşması en muhtemel belirtiler düşük kan basıncı (kafanızda hafiflik hissetme, baş dönmesi, bulanık görme, zayıflık, ani bilinç kaybı) veya hiperkalemi, kanda yüksek potasyum seviyeleridir (kas krampları, ishal, bulantı, baş dönmesi veya baş ağrısı ile kendini gösterir).

EPLEDAY'ı kullanmayı unutursanız:

Eğer bir sonraki tabletinizi alma zamanınıza çok yakın bir zamanda hatırlarsanız, unuttuğunuz tableti atlayınız ve bir sonraki tableti zamanında alınız.

Aksi durumda hatırlar hatırlamaz; bir sonraki tabletinize 12 saatten daha fazla zaman kalacak şekilde tabletinizi alınız. Sonrasında ilacınızı normal zamanında almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EPLEDAY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size söylemediği sürece EPLEDAY almayı durdurmayınız. EPLEDAY almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. EPLEDAY kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EPLEDAY'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde de yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

| | |
|----------------|--|
| Çok yaygın | :10 hastanın en az birinde görülebilir. |
| Yaygın | :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. |
| Yaygın olmayan | :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. |
| Seyrek | :1000 hastanın birinden az görülebilir. |
| Çok seyrek | :10000 hastanın birinden az görülebilir. |
| Bilinmiyor | : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. |

Aşağıdakilerden biri olursa EPLEDAY'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Yüz, dil ve boğazda şişme
- Yutma güçlüğü
- Ürtiker ve nefes almada zorluk

Bunlar anjiyönötik ödemin belirtileridir.

Hipertansiyon

Yaygın:

- Baş dönmesi
- Grip benzeri belirtiler
- Yüksek kolesterol (hiperkolesterolemi), yüksek trigliserid (hipertrigliseridemi)
- Öksürük
- Karın ağrısı, ishal
- Karaciğer enzimlerinde artış (yüksek Gama-Glutamil-Transferaz (GGT), yüksek Alanin Amino Transferaz (SGPT))
- İdrarda albümin bulunması (albüminüri)
- Yorgunluk
- Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi (hiperkalemi)

Yaygın olmayan:

- Erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti)
- Erkeklerde memede ağrı (mastodini)
- Kadınlarda vajinal kanama

Kalp yetmezliği:

Yaygın:

- Kalp krizi
- Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi (hiperkalemi) (belirtileri kas krampları, ishal, bulantı, baş dönmesi veya baş ağrısını içerebilir)
- Baş dönmesi
- Baygınlık
- Enfeksiyon
- Öksürük
- Kabızlık
- Düşük tansiyon (hipotansiyon)
- İshal
- Mide bulantısı
- Anormal böbrek fonksiyonu
- Döküntü
- Kaşıntı
- Kas spazmı veya ağrısı
- Kanınızda artmış üre seviyesi

Yaygın olmayan:

- Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofili)
- Su kaybı (dehidrasyon)
- Yüksek kolesterol (hiperkolesterolemi), yüksek trigliserid (hipertrigliseridemi)
- Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi)
- Uykusuzluk
- Baş ağrısı
- Kalp rahatsızlıkları örn. düzensiz kalp atışı, hızlı kalp atışı ve kalp yetmezliği
- Safra kesesi iltihabı
- Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (postural hipotansiyon)
- Bacakta kan pıhtısı (tromboz)
- Boğaz ağrısı (farenjit)
- Şişkinlik
- Kusma
- Düşük tiroid fonksiyonu
- Kan şekeri seviyesinde artış
- Dokunma duyusunda azalma
- Terlemede artış
- Sırt ağrısı
- Zayıf hissetme ve genellikle iyi hissetmeme
- Böbrek fonksiyon bozukluklarını işaret edebilecek yüksek kan kreatinin seviyeleri
- Böbrek iltihabı
- Erkeklerde meme büyümesi
- Bazı kan testi sonuçlarında değişiklikler

Bilinmiyor:

- Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)

Eğer bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığımız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. EPLEDAY'in saklanması

EPLEDAY'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EPLEDAY'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3
Esenler / İSTANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Faks: 0 212 482 24 78
e-mail: bilgi@neutec.com.tr

Üretim Yeri: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. 1. Yol No: 3
Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.