

KULLANMA TALİMATI

DİYACURE 250 mg kapsül
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül liyofilize *Saccharomyces boulardii* (250 mg mayaya eşdeğer) 282,50 mg içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, jelatin, titanyum dioksit

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de DİYACURE'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. DİYACURE nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. DİYACURE'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. DİYACURE nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. DİYACURE'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. DİYACURE nedir ve ne için kullanılır?

DİYACURE'ün etkin maddesi olan *Saccharomyces boulardii*, biyolojik kaynaklı bir ishal kesicidir (antidiyareik).

DİYACURE, karton kutulara koyulmuş LDPE kapaklı şeffaf Tip III cam şişe pazarlanmaktadır. Her bir şişede 10 kapsül bulunur.

DİYACURE, mikrobik (enfeksiyöz) ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılan Vankomisin/metranidazole isimli ilaçlara ek olarak *Clostridium difficile* isimli bir bakterinin neden olduğu hastalığın tekrarının önlenmesinde. Seyahata bağlı turist ishalinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

2. DİYACURE'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİYACURE'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- DİYACURE'ün içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
- Santral venöz kateteriniz varsa kullanmayınız.

DİYACURE'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir.
- Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DİYACURE'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu ilaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak hızlı bir etki sağlamak için yemeklerle birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DİYACURE'ün araç ve makine kullanımı üzerinde etkileri bildirilmemiştir.

DİYACURE'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİYACURE laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

- Saccharomyces boulardii mantarimsı yapıda olduğu için mantar önleyici (antifungal) ilaçlara karşı duyarlıdır.
- Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir.
- Monoamin oksidaz inhibitörleri ile (depresyon ve duyu durum bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) birlikte kullanıldığında hipertansiyona neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DİYACURE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde günde 1 veya 2 kapsül alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir.

DİYACURE çok sıcak, buzlu veya alkollü içeceklerle veya yiyeceklerle alınmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda günde 1 kapsül kullanılır. 6 yaşından küçük çocuklarda kapsül alamayacağı için saşe kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir kullanımı bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer DİYACURE'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla DİYACURE kullandıysanız

DİYACURE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DİYACURE kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DİYACURE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Herhangi bir etki oluşumu bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DİYACURE'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa DİYACURE'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kaşıntı, kurdeşen, deri döküntüsü
- Anafilaktik şok (yüz, boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir. Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi)

Seyrek:

- Barsaklarda gaz, midede rahatsızlık hissi

Çok seyrek:

- Ateş, mantar enfeksiyonu yayılımı (fungemi)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DİYACURE'ün saklanması

DİYACURE'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Şişe ve kutu üzerinde bulunan son kullanma tarihinden sonra DİYACURE'ü kullanmayınız. "Son Kullanma Tarihi" ambalajda yazılı ayın son günüdür.

Ruhsat Sahibi:

DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Oğuzlar Mah. 1370. Sok. 7/3 06520 Balgat-Ankara

Üretim Yeri:

DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06760 Çubuk –Ankara

Bu kullanma talimatı 08/07/2014 tarihinde onaylanmıştır.