

## KULLANMA TALİMATI

### KOMBEVİT-C draje

Ağız yolu ile uygulama içindir.

- **Etkin madde:** 15 mg Tiamin mononitrat (Vitamin B<sub>1</sub>), 15 mg Riboflavin (Vitamin B<sub>2</sub>), 10 mg Piridoksin hidroklorür (Vitamin B<sub>6</sub>), 50 mg Niyasinamid, 25 mg Kalsiyum pantotenat, 0.01 mg Siyanokobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>), 0.25 mg Folik asit ve 100 mg Askorbik asit (Vitamin C) içermektedir.
- **Yardımcı madde(ler):** Polivinil pirolidon, Talk, Magnezyum stearat, Şeker, Şellak, Titanyum dioksit, Jelatin, Arap zankı, F.D. & C Sarı no. 6, Ewax, Kalsiyum karbonat.

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de KOMBEVİT-C'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **KOMBEVİT-C nedir ve ne için kullanılır?**
2. **KOMBEVİT-C'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KOMBEVİT-C nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KOMBEVİT-C'nin saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. KOMBEVİT-C nedir ve ne için kullanılır?**

KOMBEVİT-C birden fazla vitamin içeren bir ilaçtır. Her bir karton kutu, 30 draje içermektedir.

KOMBEVİT-C vitaminler adı verilen tedavi grubu altında sınıflandırılır.

KOMBEVİT-C, B grubu vitaminleri ve C vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen durumlarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

## **2. KOMBEVİT-C'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **KOMBEVİT-C'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

– Geçmişte KOMBEVİT-C'nin içindeki etkin maddelerine veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa.

### **KOMBEVİT-C'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Bazı kansızlık durumlarında (pernisiyöz anemi ve diğer megaloblastik anemilerde) kullanılmamalıdır.

B<sub>12</sub> vitamini tam bir teşhis konmadan kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C içeriğindeki B<sub>6</sub> vitamini, emziren kadınlarda süt salgısını azaltabilir.

Göz problemi (duyu kaybı) olan kişilerde siyanokobalamin kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C alındıktan sonra idrarın sarıya boyanması, ilacın içerdiği Riboflavin (Vitamin B<sub>2</sub>)'den ileri gelmekte olup tamamen zararsız bir belirtidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **KOMBEVİT-C'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması**

KOMBEVİT-C'yi yemeklerle birlikte ya da yemeklerden sonra alabilirsiniz.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

KOMBEVİT-C doktorunuzun kontrolü altında kullanılabilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

KOMBEVİT-C emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.

KOMBEVİT-C doktorunuzun kontrolü altında kullanılabilir.

### **Araç ve makine kullanımı**

KOMBEVİT-C'nin araç ve makine kullanımını etkilediği bildirilmemiştir.

### **KOMBEVİT-C'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

KOMBEVİT-C şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

KOMBEVİT-C içeriğindeki F.D. & C Sarı no. 6 (bir tür boyar madde), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

INH (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç), siklolerin ve oral kontraseptifler (ağız yoluyla kullanılan doğum kontrol ilaçları) B<sub>6</sub> vitamini ihtiyacını arttırmırlar.

Parkinson vakalarında levodopa tedavisi üzerindeki bozucu etkisinden dolayı B<sub>6</sub> vitamini kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C içeriğindeki niasin, acil yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir gruba ait ilaçların (ganglionerjik blokerlerin) tansiyon düşürücü etkisini arttırır.

KOMBEVİT-C, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.

Simetidin ve ranitidin (ülser tedavisinde kullanılan, mide asidini azaltan ilaçlar) B<sub>12</sub> emilimini azaltır. Omeprazol (ülser ve reflü tedavisinde kullanılan, mide asidini azaltan bir ilaç), B<sub>12</sub> vitamininin emilimini etkiler. Kolşisin (gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) B<sub>12</sub> vitamininin emilimini azaltır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. KOMBEVİT-C nasıl kullanılır?**

#### **• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Erişkinler için günlük ortalama doz 2-3 drajedir.

Ancak doktorunuz hastalığınızın türüne ve şiddetine göre dozunuzu belirleyecektir.

#### **• Uygulama yolu ve metodu:**

Ağız yoluyla uygulanır. KOMBEVİT-C drajeleri bir bardak su ile yutarak alınız. Drajeleri çiğnemeyiniz.

#### **• Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Doktor tarafından önerilmedikçe çocuklarda kullanılmamalıdır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Farklı doz uygulamasına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

#### **• Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Hafif-ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği durumlarında doz azaltılması konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

*Eğer KOMBEVİT-C'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla KOMBEVİT-C kullandıysanız:**

*KOMBEVİT-C'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**KOMBEVİT-C'yi kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**KOMBEVİT-C ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

KOMBEVİT-C tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi KOMBEVİT-C'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

**Çok seyrek**

Alerjik reaksiyonlar

**Bilinmiyor**

Uyuşma (parestezi)

Uyku hali

Bu yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

**5. KOMBEVİT-C'nin saklanması**

*KOMBEVİT-C'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde saklanmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KOMBEVİT-C'yi kullanmayınız.  
Eğer ürünün ambalajında herhangi bir hasar fark ederseniz KOMBEVİT-C'yi kullanmayınız.

***Ruhsat Sahibi:***

Deva Holding A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.  
No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL  
Tel: 0212 692 92 92  
Faks: 0212 697 00 24

***İmal Yeri:***

Deva Holding A.Ş.  
Gültepe Kavşağı No: 199/A 4. Levent/İstanbul

*Bu kullanma talimatı .../.../..... tarihinde onaylanmıştır.*