

## KULLANMA TALİMATI

### NEOSET 1 mg film tablet

Ağızdan (yutularak) alınır.

- **Etkin madde:** Bir tablet 1 mg granisetrona eşdeğer miktarda granisetron hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, laktoz monohidrat, hidroksipropilmetilselüloz, magnezyum stearat ve film kaplama maddesi olarak hipromelloz, titanyum dioksit E171, makrogol 600, polisorbata 80 içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında**

1. **NEOSET nedir ve ne için kullanılır?**
  2. **NEOSET'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
  3. **NEOSET nasıl kullanılır?**
  4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
  5. **NEOSET'in saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. NEOSET nedir ve ne için kullanılır?**

- NEOSET, "5-HT<sub>3</sub> reseptör antagonistleri" veya "anti-emetikler" (bulantı ve kusmayı önleyici) olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahil olan granisetron etkin maddesini içermektedir.
- NEOSET, ilaç veya ışın ile yapılan kanser tedavilerden kaynaklanan bulantı ve kusmanın (kendini kötü ve hasta hissetme) önlenmesinde kullanılmaktadır.

#### **2. NEOSET'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

##### **NEOSET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Granisetron veya NEOSET'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız),
- Dolasetron, ondansetron, palonosetron ve tropisetron'u içeren diğer "5-HT<sub>3</sub> reseptör antagonisti" ilaçlarına karşı alerjik iseniz NEOSET'i kullanmayınız.

## **NEOSET'i ařađdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Eđer barsak tıkanıklıđından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa NEOSET'i dikkatli kullanınız.
- Eđer kalp rahatsızlıđınız varsa, kalbinize zarar verdiđi bilinen bir ila ile kanser tedavisi gryorsa veya vcudunuzda potasyum, sodyum, kalsiyum gibi tuz seviyelerinizle (elektrolit anormallikleriyle) ilgili bir sorununuz varsa NEOSET'i dikkatli kullanınız.
- ocuklarda NEOSET kullanımı nerilmemektedir.
- Eđer, NEOSET gibi bulantı ve kusma nleyici olan dolasetron, ondansetron gibi etkin maddeli ilaları da ieren diđer 5HT<sub>3</sub> reseptr antagonisti olarak adlandırılan ilaları kullanıyorsanız NEOSET'i dikkatli kullanınız.
- Serotonin sendromu, NEOSET kullanımı ile birlikte nadir grlen fakat potansiyel olarak yařamı tehdit eden bir durumdur. Bu sendrom beyninizin, kaslarınızın ve sindirim sisteminizin alıřmasında ciddi deđiřikliklere sebep olabilir. Bu reaksiyon, NEOSET'i tek bařına kullandıđınızda meydana gelebileceđi gibi, daha ok NEOSET'i diđer bazı ilalarla beraber kullanmanız durumunda ortaya ıkabilir. NEOSET ile tedavi edilmeden nce, hali hazırda kullanmakta olduđunuz ya da yakın zamanda kullanmayı planladıđınız ilalar hakkında ltfen doktorunuza, hemřirenize ya da eczacınıza bilgi veriniz.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerli ise ltfen doktorunuza danıřınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Eđer hamile iseniz veya hamile kalmaya alıřıyorsanız, doktorunuz size sylemedike NEOSET kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

NEOSET'in anne stne geip gemediđi bilinmemektedir. Bu nedenle NEOSET tedavisi gren annelerin bebeklerini emzirmemeleri nerilmektedir.

Eđer emziriyorsanız, doktorunuz size sylemedike NEOSET kullanmayınız.

### **Ara ve makine kullanımı**

NEOSET'in ara veya makine kullanma yeteneđinizi etkilemesi beklenmemektedir.

### **NEOSET'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

NEOSET bir řeker tipi olan laktoz iermektedir. Eđer doktorunuz size bazı řekerleri tolere edemeyeceđinizi veya sindiremeyeceđinizi (bazı řekerlere toleransınız olmadıđını) syledi ise, bu ilacı almadan nce doktorunuzla konuřunuz.

NEOSET'in her dozunda 1 milimol (23 mg)'den daha az miktarda sodyum bulunduđundan,

“sodyum içeriği olmadığı” kabul edilmektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

Özellikle, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzu, hemşirenizi ya da eczacınızı bilgilendiriniz:

- Düzensiz kalp atımı tedavisi için kullanılan ilaçlar,
- Dolasetron ya da ondansetron gibi diğer bulantı ve kusma önleyici “5HT<sub>3</sub> reseptör antagonisti” olarak adlandırılan ilaçlar,
- Epilepsi (nöbet) tedavisinde kullanılan fenobarbital,
- Mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ketokonazol,
- Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin adlı antibiyotik,
- Depresyon ve/veya kaygılilik durumunun tedavisinde kullanılan; fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram etkin maddeleri gibi, seçici serotonin geri alım engelleyicileri (selektif serotonin geri alım inhibitörleri),
- Depresyon ve/veya kaygılilik durumunun tedavisinde kullanılan; venlafaksin, duloksetin etkin maddeleri gibi, seçici noradrenalin geri alım engelleyicileri (selektif noradrenalin geri alım inhibitörleri).

### **3. NEOSET nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar**

NEOSET’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığımız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

#### **Bulantı veya kusma durumunun önlenmesi**

NEOSET’in ilk dozu, genellikle radyoterapinizin ya da kemoterapinizin bir saat öncesinde verilir. Kullanım dozu şu şekildedir (radyoterapinizin ya da kemoterapinizin sonrasında bir haftaya kadar):

- Günde iki kere 1 adet 1 mg tablet  
veya
- Günde bir kere 2 adet 1 mg tablet  
veya
- Günde bir kere 1 adet 2 mg tablet

#### **Bulantı veya kusma durumunun tedavisi**

Genel kullanım dozu şu şekildedir:

- Günde iki kere 1 adet 1 mg tablet  
veya
- Günde bir kere 2 adet 1 mg tablet  
veya
- Günde bir kere 1 adet 2 mg tablet.

### **Uygulama yolu ve metodu**

- Ağızdan alınmalıdır.
- Tabletleri çiğnmeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

### **Değişik yaş grupları**

#### **Çocuklarda kullanım**

Çocuklarda kullanımı yoktur.

#### **Yaşlılarda kullanım**

Özel kullanımı yoktur.

### **Özel kullanım durumları**

#### **Böbrek ve karaciğer yetmezliği**

Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almayınız.

*Eğer NEOSET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOSET kullandıysanız**

*Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOSET kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **NEOSET'i kullanmayı unutursanız**

Eğer bir doz almayı unutursanız ve kendinizi kötü ve hasta hissederseniz, hatırlar hatırlamaz alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **NEOSET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

NEOSET tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi NEOSET'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, NEOSET'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Alerjik reaksiyonlar (anafilaksi): Boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi, nefes almada ve yutmada zorluk alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEOSET'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Serotonin Sendromu: Belirtiler arasında ateş, terleme, titreme, ishal, bulantı, kusma, kas titremeleri, kasılmaları, sertleşmeleri ve çekilmeleri, aşırı aktif refleksler, koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, kan basıncında değişiklikler, sersemlik, gerginlik, yorgunluk, halüsinasyonlar, ruh hali değişiklikleri, baygınlık ve koma bulunmaktadır.

Serotonin sendromu, ciddi olmakla birlikte yaygın olmayan bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.**

NEOSET kullanımı sırasında görülebilen diğer yan etkiler şunlardır:

Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkileyebilir

- Baş ağrısı
- Kabızlık. Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.

Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazlasını etkileyebilir.

- Uyku problemleri (uykusuzluk)
- Karaciğer fonksiyonlarında kan testleri ile gösterilen değişiklikler
- İshal

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazlasını etkileyebilir.

- Deride döküntüler veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen. Kaşıntılı kırmızı kabartılar belirtiler arasındadır.
- Kalp atışında (ritim) ve EKG sonuçlarında (kalbin elektriksel ölçüm kayıtları) değişiklikler
- Titreme, kasların sertleşmesi ve kasılması gibi anormal istem dışı hareketler

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5 NEOSET'in saklanması**

*NEOSET'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOSET'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NEOSET'i kullanmayınız.

***Ruhsat sahibi:***

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad. 34303 No:1

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

***İmal yeri***

Deva Holding A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi,

Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

*Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.*