

KULLANMA TALİMATI

CANTHACUR PS® Topikal Solüsyon

7,5 ml Solüsyon içeren cam şişe

Haricen uygulanır.

Etkin maddeler: %1 Kantaridin, %30 Salisilik asit, %5 Podofillin reçinesi

Yardımcı maddeler: Etoşel, etoksietanol, kastor yağı, triton X-45, kollodion ve aseton

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- ✓ *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- ✓ *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- ✓ *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- ✓ *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- ✓ *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız*

Bu kullanma talimatında:

1. **CANTHACUR PS® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CANTHACUR PS®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CANTHACUR PS® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CANTHACUR PS®'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. CANTHACUR PS® nedir ve ne için kullanılır?

CANTHACUR PS®, 7,5 ml solüsyon içeren cam şişede Kantaridin, Salisilik asit ve Podofillin reçinesi etkin maddelerini içeren ve siğil tedavisinde haricen kullanılan bir ilaçtır.

Özellikle ayak tabanında, tırnak çevresinde görülen, mozaik (siğillerin birleşerek geniş siğil alanları oluşturması) tipte olan veya dirençli ve sert siğillerin tedavisinde tercih edilir.

Yara izinin oluşmaması, ağrısız uygulama ve uygulama için herhangi bir özel alete ihtiyaç göstermemesi CANTHACUR PS®'nin çocuklarda da kolayca uygulanmasını sağlar.

CANTHACUR PS® YALNIZCA DOKTOR TARAFINDAN UYGULANIR.

2. CANTHACUR PS®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANTHACUR PS®'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- ✓ **Eğer Kantaridin veya CANTHACUR PS®'nin herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılık varsa**

CANTHACUR PS®'yi ařağıdaki durumlarda özellikle DİKKATLE KULLANINIZ
CANTHACUR PS® güçlü bir ilaçtır ve yalnızca doktor tarafından uygulanmalıdır. Hastanın, tedavinin etkileri ve muhtemel sonuçları konusunda bilgilendirilmesi önerilir.

Şeker hastalarında veya kan dolaşımının zayıf olduğı hastalarda, benlerde, doğumsal cilt lekelerinde ve üzerinde kılların bulunduğı nadir siğillerde kullanılmaması önerilir. Geniş siğillerde, rahatsızlık fazla olabileceğı ve ilacın emilim riski ortaya çıkabileceğı için bir kaç seansta uygulama önerilir.

İletişim kuramayacak düzeyde küçük olan çocuklarda, ağrının kontrolü mümkün olamayacağı için kullanılmamalıdır.

Tedaviden sonraki birkaç saat süresince alkollü içeceklerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

CANTHACUR PS® yiyecek ve içecek ile kullanılması

Canthacur PS® sadece haricen kullanılır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamilelikte kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

CANTHACUR PS®'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CANTHACUR PS®'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere ilişkin önemli bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deri üzerinde tahriş edici etki yapan ilaçlar ile eş zamanlı veya birbiri ardına kullanılmamalıdır. Kullanılma durumunda birkaç hafta ara verilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CANTHACUR PS® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

CANTHACUR PS® YALNIZ DOKTOR TARAFINDAN KULLANILIR. BU İLACI KENDİNİZ UYGULAMAYINIZ.

Doktorunuz hastalığınıza bağılı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

CANTHACUR PS® yalnız doktor tarafından kullanılır. Bu nedenle uygulama yolu ve metodunu doktorunuz belirleyecektir.

Değişik yaş gruplarında kullanım

Çocuklarda kullanımı:

İletişim kuramayacak düzeyde küçük olan çocuklarda, ağrının kontrolü mümkün olamayacağı için kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumlarına ilişkin bir bilgi yoktur.

Eğer CANTHACUR PS®'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANTHACUR PS® kullandıysanız

CANTHACUR PS® güçlü bir ilaçtır ve hem siğilli bölgede hem normal cilt veya mukoza bölgelerinde önerilen miktardan fazla uygulandığında içi su dolu kesecikler ve ülserler oluşabilir.

CANTHACUR PS® yalnız doktorunuz tarafından uygulanan bir ilaç olduğu için uygulama miktarına doktorunuz karar verecektir.

CANTHACUR PS®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer CANTHACUR PS®'yi kullanmayı unutursanız

Tedavi zamanları ve uygulama için yalnız doktorunuza danışınız.

CANTHACUR PS®'yi yalnızca doktor tarafından kullanılır. Bu ilacı kendiniz uygulamayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CANTHACUR PS® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CANTHACUR PS® içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek: Küçük bir hasta gurubunda CANTHACUR PS® tedavisinden sonra halka şeklinde siğil geliştiği rapor edilmiştir. Bu siğiller yüzeyseldir ve bazı hastaların dikkatini çekse de bir sorun oluşturmaz. Tedavi, hastanın güveninin sağlanarak yeniden CANTHACUR PS® tedavisinin veya başka uygun bir tedavinin yapılmasıdır.

İlaçlı bant ile beraber CANTHACUR PS®'nin kullanıldığı bir hastada lenf damarlarında iltihaplanma rapor edilmiştir.

Not: CANTHACUR PS® güçlü bir ilaçtır ve normal cilt veya mukoza bölgeleri ile temas ederse içi su dolu kesecikler oluşabilir. Deri üzerine dökülürse, hemen yıkayın, alkol, aseton veya kaldırıcı band kullanarak ilacın bölgeden uzaklaşmasını sağlayın. Ilık sabunlu su ile iyice yıkayıp durulayın. Mukozaya ve göze temas ederse, su ile hemen yıkayın. İlacın cilt bölgesinden uzaklaşmasını sağlayarak şekilde 15 dakika boyunca su ile yıkamaya devam edin.

Bunlar CANTHACUR PS®'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildirin.

5. CANTHACUR PS®'nin saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altında oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANTHACUR PS®'yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve /veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CANTHACUR PS®'yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A. Ş.
Aşağı Dudulu Mah. Tosya Cad. No:5, 34773 Ümraniye, İstanbul

Üretim Yeri: Paladin labs. Inc. (Pharmascience şirketinin alt grubudur) adına
Entreprise Importfab Inc., 50 Hymus Boul., Pointe Claire,
Quebec, Kanada

Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıştır.