

KULLANMA TALİMATI

BROMEK Tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 8 mg bromeksin hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mısır nişastası, laktoz, talk, magnezyum stearat, koloidal silikon dioksit, jelatin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BROMEK Tablet nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BROMEK Tablet'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BROMEK Tablet nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BROMEK Tablet'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BROMEK Tablet nedir ve ne için kullanılır?

BROMEK Tablet, plastik kapaklı renkli cam şişede 50 tabletlik ambalajlarda sunulan ve etkin madde olarak 8 mg Bromeksin HCl içeren tabletlerdir. BROMEK Tablet, geçmeyen öksürüklerde balgam sökmekte zorlanılıyorsa, balgam sökücü olarak kullanılır.

2. BROMEK Tablet'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BROMEK Tablet'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bromeksin hidroklorür veya BROMEK Tablet'in içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BROMEK Tablet'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Mide ülseriniz var ise doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

BROMEK Tablet'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Yiyecek veya ieceklerle kullanılmasında herhangi bir sorun yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BROMEK iin, hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır. Hayvan deneylerindeki tedavi dozlarında kullanıldıėında fetüste herhangi bir hasar oluřtuėuna dair kanıt bulunamamıřtır.

Gerekli olduėu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BROMEK Tablet az da olsa anne sütüne gemektedir. Doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

ok seyrek de olsa bař dnmesine sebep olabileceėinden, ara ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

BROMEK Tablet'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BROMEK Tablet ieriėinde laktoz bulunur. Eėer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduėu sylenmiře bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

Diėer ilalar ile birlikte kullanımı

Antitüsif (öksürük kesici) ve ifrazatı kurutan atropin ve benzeri ilalarla bir arada kullanılmamalıdır.

Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BROMEK Tablet nasıl kullanılır?

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıka, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıėı iin talimatlar:

Yetiřkinler ve 12 yař üzeri ocuklar:

Ortalama günlük doz 3 defa 1 Tablet

Gerektiėi zaman 3 defa 2 tablet kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

BROMEKSİN Tablet sadece aėızdan kullanım iindir. Bir bardak su ile alınır. ok uzun süreli kullanımlar iin uygun deėildir. Tedaviye bařladıktan sonra 14 günde belirtilerde düzelme olmaz veya řiddetlenirse doktora danıřılmalıdır.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanım:**

6-12 yaş arası çocuklarda günde 3 defa yarım tablet (toplam günde 12 mg) 2-6 yaş arası çocuklarda günde 2 defa çeyrek tablet (toplam günde 4 mg)

Yaşlılarda kullanım:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları**Böbrek, karaciğer yetmezliği**

Böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Ağır karaciğer hastalarında doktor kontrolünde alınmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

BROMEK Tablet çocuk hastalarda uygulama yolu ve metodu kısmında belirtildiği gibi uygulanmalıdır. İki yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Eğer BROMEK Tablet'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BROMEK Tablet kullandıysanız :

BROMEK Tablet'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BROMEK'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BROMEK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

BROMEK Tablet tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BROMEK Tablet'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BROMEK Tablet'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

Deri döküntüleri, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme ve şişmeye bağlı yutma veya nefes alma güçlüğü.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin BROMEK Tablet'e karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Bulantı, ishal, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme.

Bunlar BROMEK Tablet'in zayıf yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BROMEK Tablet'in saklanması :

BROMEK Tablet'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Işıktan koruyarak, 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra BROMEK Tablet'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BROMEK Tablet'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66
Üsküdar / İstanbul

İmal yeri : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy tarihinde onaylanmıştır.