

## KULLANMA TALİMATI

### TUSCOD 7.5 mg/5 ml Şurup Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurup, 7,5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/ml) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** : Sodyum sakarin dihidrat, sodyum siklamat anhidrus, benzoik asit, gliserol (E210), sorbitol (E420), kayısı aroması, sodyum hidroksit % 10 a/a veya hidroklorik asit % 10 a/a, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

- 1. TUSCOD nedir ve ne için kullanılır?**
  - 2. TUSCOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
  - 3. TUSCOD nasıl kullanılır?**
  - 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
  - 5. TUSCOD'un saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. TUSCOD nedir ve ne için kullanılır?**

- TUSCOD etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
- TUSCOD "öksürük baskılayıcı ilaçlar" olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- TUSCOD 100 ml ve 200 ml'lik amber renkli cam şişede, 5 ml'lik kaşık ölçekle birlikte karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
- TUSCOD çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

### **2. TUSCOD'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **TUSCOD'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya TUSCOD'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa

Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise TUSCOD'u kullanmayınız.

#### **TUSCOD'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. TUSCOD'un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamile iseniz, ilk üç ay TUSCOD kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse TUSCOD kullanabilirsiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Bebeğinizi emziriyorsanız, TUSCOD almadan önce doktorunuza danışınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

TUSCOD uyuklu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

### **TUSCOD'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

- TUSCOD sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
- Bu tıbbi ürün her 5 ml'lik dozunda 1 mg sodyum sakarin dihidrat ve 1.5 mg sodyum siklamat anhidrus ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
- Bu tıbbi ürün benzoik asit içermektedir. Ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. TUSCOD nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez

6-12 yaşındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2 kaşık (10 ml)

Ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 3 kaşık (15 ml)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 3 kaşık (15 ml)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, TUSCOD'u bir haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

**Uygulama yolu ve metodu:**

TUSCOD ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için kaşık ölçeği kullanınız. Kaşık ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulayınız.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

TUSCOD'un 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

**Yaşlılarda kullanımı:**

TUSCOD'un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

**Özel kullanım durumları:**

TUSCOD böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

*Eğer TUSCOD'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla TUSCOD kullandıysanız:**

*TUSCOD'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.*

**TUSCOD'u kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Aşırı dozda TUSCOD alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

**TUSCOD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, TUSCOD'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa TUSCOD'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer sizde mevcut ise, sizin TUSCOD'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

- Uyku hali
- Bulantı

- İshal

Bunlar TUSCOD'un hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. TUSCOD'un saklanması**

*TUSCOD'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TUSCOD'u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TUSCOD'u kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat sahibi :** Karfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Konya Organize Sanayi Bölgesi Kırım Cad.  
No:15/A 42300 Selçuklu - Konya  
e-mail: [info@karfarma.com.tr](mailto:info@karfarma.com.tr)

**Üretim Yeri :** Şifa Kimya İlaç Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.  
2. Organize Sanayi Bölgesi Kırım Cad. No:15  
Selçuklu - Konya

*Bu kullanma talimatı .././...tarihinde onaylanmıştır.*