

## KISA ÜRÜN B LG LER

### 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI

KORAB N 40 mg / 2 ml IV/SC intratekal enjeksiyon / infüzyon için çözelti içeren flakon

### 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M

#### Etkin madde:

Her 2 ml'lik flakonda;

Sitarabin 40.00 mg

#### Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür 12.00 mg

Sodyum laktat çözeltisi % 60 8.320 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

### 3. FARMASÖT K FORM

Enjeksiyonluk çözelti.

Renksiz, berrak çözelti.

### 4. KL N K ÖZELL KLER

#### 4.1. Terapötik endikasyonlar

KORAB N yeti kinlerde ve çocuklarda monoterapi olarak veya di er kemoterapötiklerle kombine halde a a ıdaki durumlarda kullanılır:

- Akut myeloid lösemi (AML)
- Akut lenfoblastik lösemi (ALL)
- Kronik myeloid lösemi (KML)
- Orta derecede Non-Hodgkin lenfomalar ve yüksek maligniteli Non-Hodgkin lenfomalar (lenfoblastik Non-Hodgkin lenfomalar ve Burkitt tipi Non-Hodgkin lenfomalar gibi)

KORAB N merkezi sinir sistemindeki lösemilerin tedavisi ve profilaksi amaçlı tek ba ına veya metotreksat ve kortikosteroidlerle kombine halde intratekal olarak uygulanabilir.

## **4.2. Pozoloji ve uygulama ekli**

### **Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi**

Remisyon indüksiyonu:

Remisyon indüksiyonu için konvansiyonel dozlar; günde 100-200 mg/m<sup>2</sup>'dir. Ço u durumda devamlı intravenöz infüzyon veya 5-10 gün boyunca hızlı infüzyon olarak uygulanır.

Tedavi sıklığı nın süresi, klinik ve morfolojik sonuçlara (kemik ili i fonksiyonu) ba lıdır.

Remisyon idamesi:

Remisyon idamesi dozu genellikle günde 70-200 mg/m<sup>2</sup>'dir. 4 hafta arayla 5 gün boyunca veya haftada bir defa, hızlı intravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon olarak uygulanır.

Non-Hodgkin lenfoma tedavisi:

Yeti kinlerde bu endikasyon için polikemoterapi programları kullanılır. Çocuklarda bu endikasyonda KORAB N kullanımı hastalığı nın evresine ve histolojik özelli ine ba lıdır. Farklı dozlarda farklı tedavi protokollerine ba vurulur.

Yüksek doz tedavisi:

Yüksek doz tedavilerde dozaj genellikle 1-3 g/m<sup>2</sup>'dir. 4-6 gün boyunca 12 saat arayla 1-3 saatlik intravenöz infüzyon olarak uygulanır.

intratekal uygulama:

Ola an doz 5-75 mg/m<sup>2</sup>'dir.

Uygulama sıklığı ve dozaj, rejime göre de i kenlik gösterir. En sık kullanılan doz; serebrospinal sıvı yüksek sayıda malign hücre içermeyinceye kadar, her 4 günde bir 30 mg/m<sup>2</sup>'dir.

### **Uygulama ekli:**

KORAB N oral olarak aktif de ildir. Uygulama ekli ve çizelgesi kullanılan tedavi programına göre de i ir. KORAB N, intravenöz infüzyon veya enjeksiyon, subkutan ya da intratekal olarak uygulanabilir.

KORAB N yalnızca kemoterapi konusunda deneyimi olan hekimler tarafından reçete edilmelidir ve sadece, destekleyici tedavi için yeterli olanakları olan, kemoterapiye uygun kliniklerde uygulanmalıdır.

KORAB N tek başına uygulanabilir, ancak ço u kez di er ilaçlarla kombine olarak uygulanır.

Bir infüzyon hazırlanırken KORAB N, % 0.9'luk sodyum klorür veya % 5'lik glukoz ile seyreltilmelidir.

Hastalar, yava infüzyona kıyasla hızlı intravenöz infüzyon yoluyla ilacı aldıklarında daha yüksek total dozları tolere edebilirler. Bu fenomen hızlı enjeksiyon sonrasında, ilacın hızlı inaktivasyonu ve duyarlı normal ve neoplastik hücrelerin yüksek seviyede ilaca kısa sürede maruz kalmalarıyla alakalıdır. Normal ve neoplastik hücreler bu farklı uygulama ekillerine bir bakıma paralel biçimde cevap verir gibi görünmektedir ve her iki uygulama için de herhangi bir bariz klinik avantaj gösterilmemi tir.

E er enjeksiyonluk çözeltinin intratekal uygulama için seyreltilmesi gerekiyorsa, yalnızca koruyucu içermeyen % 0.9'luk sodyum klorür kullanılmalıdır.

### **Özel popülasyonlara ili kin ek bilgiler:**

#### **Böbrek / Karaci er yetmezli i:**

Böbrek yetmezli i durumunda dozun azaltılması gerekebilir. Kreatinin klirensi 60ml/dak.'dan dü ükse beraberinde nörotoksosite riskinde bir artı olur.

Daha önceden karaci er fonksiyon bozuklu u olan hastalarda ilaç, son derece dikkatli uygulanmalıdır ve risk-yarar durumu titizlikle de erlendirilmelidir.

Karaci er yetmezli i durumunda dozun azaltılması gerekebilir.

#### **Pediyatrik popülasyon:**

Çocukların yeti kinlerden daha yüksek dozları tolere etti i görülmü tür. Verilen doz aralıklarında çocuklar daha yüksek dozları almalıdır.

#### **Geriyatrik popülasyon:**

Ya lılarda doz de i ikli i gerekti ini gösteren bir veri bulunmamaktadır. Ancak ya lı

hastalar toksik reaksiyonlara daha duyarlı oldu undan, ilaç kaynaklı lökopeni, trombositopeni ve anemiye özellikle dikkat edilmelidir.

#### **4.3. Kontrendikasyonlar**

- Hekim tarafından hasta için ya amsal öneme sahip bir tedavi oldu u belirtilmedi i sürece halihazırda kemik ili i supresyonunu indükleyen ilaç alan hastalara KORAB N uygulanmamalıdır.
- Sitarabine veya ilacın içeri indeki yardımcı maddelere a ır duyarlılı ı olanlarda kontrendikedir.
- Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

#### **4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri**

KORAB N tedavisine ba lanmadan önce kardiyak ve hepatik fonksiyon ile hematoloji testleri yapılmalıdır.

Akut lösemi hastaları daima kemoterapi alanında deneyimli bir hekimin gözetimi altında tedavi edilmelidir. Yakın gözlem ve laboratuvar takibi gerekli oldu undan, tedavi süresince hastaların hastanede yatmaları tavsiye edilir. Hematoloji, karaci er ve böbrek fonksiyon testleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Kandaki ürik asit seviyelerinin düzenli olarak takibi önerilir (neoplastik hücrelerin lizisi nedeniyle hiperürisemi oluşabilir).

Çok miktarda blast hücreleri veya geni tümör kütleleri olan hastalarda (Non-Hodgkin lenfomalar) hiperürisemi profilaksisi gereklidir.

Hızlı intravenöz infüzyonlar, yavaş intravenöz infüzyonlardan daha iyi tolere edilir.

Daha önceden karaci er fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ilaç, son derece dikkatli uygulanmalıdır ve risk-yarar durumu titizlikle değerlendirilmelidir.

KORAB N, akut ve/veya ağır enfeksiyonlu hastalara uygulanmamalıdır.

KORAB N'in deri ve mukoz membranlar ile temasından kaçınılmalıdır. Kazara teması halinde temas eden deri bol su ve sabunla yıkanmalıdır.

Tahmin edilebilen hematolojik toksisiteye ek olarak, sitarabin merkezi sinir sistemi (MSS), gastrointestinal sistem veya akciğerleri etkileyen a ır, bazı durumlarda hayatı tehdit edici yan etkilere yol açabilir.

Yüksek doz tedavi süresince MSS ve akciğer fonksiyon testleri tecrübeli bir hekim tarafından takip edilmelidir. Oftalmolojik komplikasyonları önlemek için gözler düzenli olarak suyla yıkanmalıdır.

A ır gastrointestinal reaksiyonlar olu rursa destekleyici tedavi endikedir.

Daha önceden gastrointestinal ülseri olan hastalar hemoraji belirtileri bakımından yakından takip edilmelidir.

Bu tıbbi ürün her 2 ml'lik dozunda 23 mg'dan az sodyum içerir. Sodyuma ba lı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

#### **4.5.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim etkileri**

Diğer onkolojik ajanlarla tedavi, mielosupresif ilaçlar veya radyasyon tedavisi, bu ilaçların immunosupresif etkisini azaltabilir. Doz ayarı gerekli olabilir.

Sitarabin tedavisi esnasında digoksinin plazma seviyeleri takip edilmelidir. Tek bir doz bile kararlı durum plazma seviyesini etkileyebilir. Digitoksinin etkilenmesi beklenmez. Bundan dolayı digitoksinle de i im bir seçenek olabilir.

*n vitro* bir çalı ma sitarabinin, Klebsiella pnömonisine kar ı gentamisininin etkinli ini önledi ini göstermiştir. Eğer gentamisin tedavisi etki göstermiyorsa, antibiyoti in de i tirilmesi dikkate alınmalıdır.

Sitarabin ile diğ er sitotoksik ilaçların kombine uygulanması özellikle kemik ili i toksisitesi olmak üzere toksisiteyi kuvvetlendirir.

Sitarabin ile flusitozin kombinasyonu, flusitozinin etkinli inin azalmasına yol açabilir.

#### **Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler**

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalı ması tespit edilmemi tir.

### **Pediyatrik popülasyon:**

Pediyatrik popülasyona ili kin herhangi bir etkile im çalı ması tespit edilmemi tir.

### **4.6. Gebelik ve laktasyon**

#### **Genel tavsiye**

Gebelik kategorisi: D

#### **Çocuk do urma potansiyeli bulunan kadınlar/Do um kontrolü (Kontrasepsiyon)**

Cinsel olarak aktif tüm kadın ve erkek hastalar KORAB N tedavisi sırasında ve tedaviden sonra 6. aya kadar uygun do um kontrol yöntemi kullanmalıdır.

KORAB N tedavisi geri dönü ümsüz infertiliteye neden olabilece inden, erkek hastalar tedavi öncesinde sperm korunmasıyla ilgili bilgi almalıdırlar.

#### **Gebelik dönemi**

Sitarabinin gebelik ve/veya fetus/yeni do an üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. KORAB N gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

#### **Laktasyon dönemi**

KORAB N tedavisi süresince anne sütü verilmemelidir.

#### **Üreme yetene i / Fertilite**

Sitarabin geri dönü ümsüz infertiliteye sebep olabilir.

### **4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler**

KORAB N araç ve makine kullanımını hafif ve orta derecede etkileyebilir. Bulantı, kusma ve göz ikayetleri olan hastaların araç ve makine kullanması tavsiye edilmez.

### **4.8. stenmeyen etkiler**

stenmeyen etkiler görülme sıklıklarına göre a a ıdaki ekilde sıralanmı tır:

Çok yaygın ( 1/10); yaygın ( 1/100, <1/10); yaygın olmayan ( 1/1.000, 1/100); seyrek ( 1/10.000, <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

**Kan ve lenf sistemi hastalıkları:**

Yaygın: Anemi, megaloblastoz, lökopeni, granülositopeni, trombositopeni, kanama.

Yaygın olmayan: Sepsis, immunosupresyon.

**Ba ı ıklık sistemi hastalıkları:**

Çok yaygın: Sitarabin (Ara-C) sendromu; tedaviye başladıktan 6-12 saat sonra ateş, miyalji, kemik ağrısı, sebebi bilinmeyen göğüs ağrısı, eksanlem, konjunktivit ve bulantı olabilir. Kortikosteroidler tedavi ve profilaksi amaçlı kullanılabilir. Bunlar etkili olduğu takdirde sitarabin tedavisine devam edilebilir. Miyelosupresyon ağır ve uzun süreli olabilir.

Yaygın olmayan: Alejrik ödem, anafilaksi. Resüsitasyonun uygulandığı kardiyopulmoner areste sebep olan bir anafilaksi vakası rapor edilmiştir. Bu vaka sitarabinin intravenöz uygulanmasından hemen sonra oluşmuştur.

**Sinir sistemi hastalıkları:**

Aşağıdaki durumlarda MSS toksisitesi ihtimalinde artış görülür:

- Sitarabinin intratekal olarak uygulanması,
- intratekal sitarabin uygulanmasının, radyasyon, yüksek doz tedavi veya intratekal metotreksat gibi merkezi sinir sistemine toksik etki gösteren diğer tedavilerle kombine edilmesi,
- intratekal sitarabinin kısa aralıklarla veya 30 mg/m<sup>2</sup>'nin üzerindeki dozlarda uygulanması.

Yaygın: Yüksek dozaj durumunda, bilinç seviyesinde azalma, disartri, nistagmus, nöbet (intratekal verildiğinde), baş ağrısı, baş dönmesi, nörit ile serebellar veya serebral toksisite.

Yaygın olmayan: intratekal uygulama durumunda parapleji.

Çok seyrek: intratekal uygulama sonrasında nekrotizan lökoensefalopati, parapleji veya kuadripleji bildirilmiştir.

**Göz hastalıkları:**

Yaygın: Reversibl hemorajik konjunktivit (fotofobi, batma, görme bozuklukları,

lakrimasyon artışı), keratit. Hemorajik konjunktivite karşı profilaktik olarak glukokortikoidlerin lokal yolla uygulanması tavsiye edilir.

Çok seyrek: intratekal uygulama sonrasında körlük bildirilmiştir.

### **Kardiyak hastalıklar:**

Yaygın olmayan: Perikardit, göğüs ağrısı

Çok seyrek: Aritmi. Sitarabin tedavisinden sonra kardiyomiyopati rapor edilmiştir.

### **Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar:**

Yaygın olmayan: Pnömoni, dispne, interstisyel pnömoni, pulmoner ödeme varan ani solunum distress sendromu, bronşit iltihabı

### **Gastrointestinal hastalıklar:**

Yaygın: Oral/anal enflamasyon veya ülserasyon, mukozit, stomatit, anoreksi, disfaji, abdominal ağrı, bulantı, kusma, diyare.

Yaygın olmayan: intratekal uygulama sonrası özofajit, özofajeal ülserasyon, pnömatoz, kistoid intestinaliz, nekrotizan kolit, gastrointestinal perforasyon, bulantı, kusma.

### **Hepato-bilier hastalıklar:**

Yaygın: Enzim düzeylerinde artış ile karaciğer üzerinde reversibl etkiler.

Yaygın olmayan: Sarılık.

### **Deri ve deri altı doku hastalıkları:**

Yaygın: Eritem bülöz, ürtiker, vaskülit, alopesi gibi deri üzerine reversibl yan etkiler.

Yaygın olmayan: Lentigo, enjeksiyon bölgesinde selülit, deri ülserasyonu, prurit, el ayası ve ayak tabanında yangılı ağrı.

Çok seyrek: Nötrofilik ekrin hidradenit.

### **Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları:**

Yaygın olmayan: Miyalji, artralji

Çok seyrek: Sitarabin tedavisinden sonra rabdomiyoliz rapor edilmiştir.

### **Böbrek ve idrar hastalıkları:**

Yaygın olmayan: Böbrek fonksiyon bozuklukları, üriner retansiyon.

### **Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili kin hastalıklar:**

Yaygın: Ate , enjeksiyon bölgesinde tromboflebit, hiperürisemi.

Yaygın olmayan: ntratekal uygulama sonrasında ate .

### **üpheli advers reaksiyonların raporlanması:**

Ruhsatlandırma sonrası üpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem ta ırmaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sa lar. Sa lık mesle i mensuplarının herhangi bir üpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

### **4.9. Doz a ımı ve tedavisi**

Doz a ımı durumunda, sitarabin masif hemoraji ve hayatı tehdit edici enfeksiyonları içeren a ır kemik ili i depresyonuna yol açabilir. Aynı zamanda nörotoksisite de olu abilir. Sitarabin tedavisi durdurulmalı ve total kan veya trombosit transfüzyonu ve antibiyotikleri içeren gerekli destekleyici tedaviye ba lanmalıdır.

Sitarabin hemodiyaliz ile uzakla tırılabilir ancak doz a ımı sonrasında etkinli ini gösteren bir veri bulunmamaktadır.

Sitarabinin özel bir antidotu bulunmadı ından, her bir doz büyük bir titizlikle uygulanmalıdır.

## **5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER**

### **5.1. Farmakodinamik özellikler**

Farmakoterapötik grup: Antimetabolit (primidin analo u)

ATC Kodu: L01BC01

KORAB N'in aktif bile eni olan sitarabin pirimidin antagonistleri serisinden bir antimetabolittir.

Sitarabin, yalnızca hücre bölünmesinin S fazı esnasında hücreleri etkileyebilen bir hücre-siklüs-faz-spesifik antineoplastik ajandır. Sitarabin intraselüler olarak aktif metaboliti olan sitarabin-5 trifosfat (ara-CTP)'a dönü ür. Etki mekanizması tam olarak anla ılmamakla

beraber ara-CTP'nin ba lıca DNA polimeraz inhibisyonu yoluyla etki gösterdi i görülmü tür. DNA ve RNA içerisine inkorporasyon aynı zamanda sitarabin sitotoksitesine de katkıda bulunabilir.

## 5.2 Farmakokinetik özellikler

### Genel özellikler

#### Emilim:

Sitarabin hızla metabolize olur ve oral olarak etkisizdir. Oral olarak uygulanan dozun %20'sinden azı gastrointestinal kanaldan emilir.

Devamlı intravenöz uygulama ile daha sabit plazma seviyelerine ula ılır.

Sitarabinin subkutan ve intramüsküler uygulamasından sonra, intravenöz uygulamadan önemli derecede daha dü ük olan doruk plazma seviyelerine enjeksiyondan yaklaşık 20-60 dakika sonra ula ılır.

Sitarabinin serum seviyeleri aynı doz için hastadan hastaya dikkate de er bir de i iklik gösterir. Bazı çalı malar bu de i ikliklerin klinik cevapla ba lantılı olabilece ini göstermiştir: yüksek serum seviyeleri, en etkin hematolojik remisyonları temin eder.

#### Da ılım:

Sitarabinin da ılım hacmi 0.7 l/kg'dır. Sitarabin intravenöz olarak uygulandı nda kan-beyin bariyerini yalnızca sınırlı bir miktarda geçebilece inden, MSS lösemi tedavisinde ve profilaksiste intratekal olarak uygulanmalıdır. Sitarabinin intratekal uygulanması son derece dü ük plazma seviyeleri ile neticelenir.

0.005-1 mg/l konsantrasyonlarda plazma proteinlerinde ba lanma oranı dü üktür (% 13.3). Ba lanan ilaç yüzdesi belirtilen sınırlar içerisinde konsantrasyondan ba ımsızdır.

#### Biyotransformasyon:

Sitarabin lösemik blast hücrelerde ve sa lıklı kemik ili inde fosforilasyon yoluyla deoksisitidin kinaz ve di er nükleotidazlar vasıtasıyla hızla aktif formuna dönü ür (sitarabin-5 trifosfat). naktif bile ik urasilarabinozide metabolizma (1-beta-D-arabinofuranozilurasil) sitidin deaminaz aktivitesi bakımından ba lıca karaci erde ve daha az derecede di er dokular

ile kanda yer alır.

Bir hücrenin sitarabine direnci ya da duyarlılığı kinaz ve deaminaz enzimleri arasındaki dengeye bağlıdır.

#### Eliminasyon:

intravenöz enjeksiyondan sonra sitarabinin plazmadan uzaklaşma süreci bifaziktir. Dağılım fazındaki yarı ömrü 10 dakika, atılım fazındaki yarı ömrü ise 1-3 saattir.

24 saat içinde verilen dozun yaklaşık % 80'i idrarla atılır. İdrarla atılan sitarabinin % 90'ı inaktif metaboliti, % 10'u ise dehidroamino haldedir.

Serebrospinal sıvıda düşük sitarabin deaminaz aktivitesi nedeniyle, MSS'de sitarabinin eliminasyon yarı ömrü 3-3.5 saattir.

#### Dozrusallık / dozrusal olmayan durum:

Veri yoktur.

### **5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri**

Yapılan çalışmalarda sitarabinin genotoksik (*in vivo* ve *in vitro*) olduğu ve klinik olarak uygun doz rejiminde organogenez esnasında gebe memelilerde maruziyet olursa embriyotoksik ve teratojenik olduğu rapor edilmiştir.

Sitarabin aynı zamanda yeni doğan memelilere uygulandığında (insanlarda 3. trimestere geçmeden önce periyod) beyin gelişiminde hasara sebep olduğu ve farelerde *in vivo* anormal spermatozoa sıklığını artırmıştır.

Sitarabinin hayvanlarda karsinojenik olduğu gösterilmiştir. Hastalar için uzun dönem stratejiler belirlenirken karlılaştırılabilir etki olasılığını hesaba katılmalıdır.

## **6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER**

### **6.1. Yardımcı maddelerin listesi**

Sodyum klorür

Sodyum laktat çözeltisi % 60

Laktik asit

Enjeksiyonluk su

## **6.2. Geçimsizlikler**

Bu tıbbi ürün Bölüm 6.6.'da belirtilenler dışındaki diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Heparin, insülin, metotreksat, 5-fluorourasil, nafsilin, oksasilin, benzilpenisilin ve metilprednisolon sodyum süksinat ile fiziksel geçimsizlik gösterilmemiştir.

## **6.3. Raf ömrü**

24 ay

## **6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler**

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Seyreltme sonrası stabilite:

% 0.9'luk sodyum klorür çözeltisi ve % 5'lik glukoz çözeltisi ile seyreltikten sonra fiziksel ve kimyasal stabilite 2-8°C'de 4 gün ve 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında 24 saat olarak belirtilmiştir.

Mikrobiyolojik açıdan bakıldığında; ürün seyreltikten sonra derhal kullanılmalıdır. Eğer hemen kullanılmazsa kullanımdan önceki saklama koşulları ve saklama süresi kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrıca rekonstitüsyon/dilüsyon kontrollü valide aseptik şartlar altında olmadıkça, normal olarak 2-8°C'de 24 saatten veya 25°C'nin altında 12 saatten daha uzun süre saklanmamalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

## **6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği**

Her biri, 2 ml izotonik çözelti içinde 40 mg sitarabin içeren 30 flakonluk ambalajlarda bulunur.

6 ml Tip I effaf cam flakon, 20 mm gri teflon tıpa, 20 mm flipoff'lu alüminyum kapak.

## **6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler**

Sitarabin infüzyon için % 0.9'luk sodyum klorür çözeltisi veya % 5'lik glukoz çözeltisi ile seyreltilmelidir.

% 0.9'luk sodyum klorür çözeltisi ile % 5'lik glukoz çözeltisinin PVS infüzyon torbaları,

PE infüzyon i eleri ve perfüzyon ırıngalarındaki 0.2 - 3.2 mg/ml konsantrasyonlarıyla geçimlili i alı ılmı tır.

ntratekal uygulama için dilüent olarak yalnızca koruyucu içermeyen % 0.9'luk sodyum klorür kullanılmalıdır.

Sitarabinin deri ile teması halinde temas eden bölge bol miktarda su ile durulanmalı, su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. E er çözelti gözler ile temas ederse derhal gözler durulanmalı ve bir göz hekimine ba vurulmalıdır.

Hamile personel bu ilaç ile alı tırılmamalıdır.

Kullanılmamı olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeli i” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Dökülen veya sızıntı yapan ürün % 5'lik sodyum hipoklorit çözeltisiyle inaktive edilebilir.

## **7. RUHSAT SAH B**

KOAK FARMA LA VE K MYA SANAY A. .

Mahmutbey Mah. Ku u Sok. No:18

Ba cılar / STANBUL

Telefon : (0212) 410 39 50

Faks : (0212) 447 61 65

## **8. RUHSAT NUMARASI**

2016/613

## **9. LK RUHSAT TAR H / RUHSAT YEN LEME TAR H**

Ruhsat tarihi: 29.08.2016

Ruhsat yenileme tarihi:

## **10. KÜB'ÜN YEN LENME TAR H**